

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА ...12.10.04...

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА  
Преди употреба прочетете внимателно!

**STOP-ACID**  
**СТОП-АЦИД**

*Какво представлява СТОП-АЦИД*

СТОП-АЦИД е антиацидно лекарство под формата на таблетки за дъвчене или смучене.

**СТОП-АЦИД** съдържа следните активно действуващи вещества в 1 таблетка: Dried Aluminium hydroxide 0,160 g, Magnesium hydroxide 0,160 g, Calcium carbonate 0,200 g.

**СТОП-АЦИД** съдържа и следните помощни вещества: манитол, аспартам, повидон, талк, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, лимонена и ментова есенция.

*За какво се използва СТОП-АЦИД*

- хиперацидитет;
- диспепсия;
- остри и хронични гастрити;
- допълнително средство при лечение на пептична (стомашна или дуоденална) язва;
- функционално-секреторни нарушения на стомаха;

*Кога не трябва да се използва СТОП-АЦИД*

- Свръхчувствителност към някое от активно действуващите вещества или някое от помощните вещества
- Пациенти с хронична бъбречна недостатъчност
- Да не се прилага при деца под 6 годишна възраст

*Внимание!*

**СТОП-АЦИД** може да се използва от диабетици!

**СТОП-АЦИД** не влияе на способността за шофиране и работа с машини.

Ако страдате от бъбречно заболяване, трябва да се посъветвате с лекар преди да приемате **СТОП-АЦИД**.

Ако оплакванията от страна на стомашно-чревния тракт са продължителни и често повтарящи се, трябва да се потърси лекарска помощ за уточняване на диагнозата.

**СТОП-АЦИД** се отпуска без лекарско предписание.

*Как се прилага СТОП-АЦИД*

Възрастни пациенти и деца над 6 годишна възраст:

Сдъвкат се или се смучат по 1-2 таблетки половин час преди хранене или 1-2 часа след хранене.



Максимална дневна доза – 12 таблетки.

Продължителност на прилагане като антиацидно – не повече от 14 последователни дни.

Таблетките могат да се дъвчат или смучат до пълно разтваряне в устата.

**Да не се погълнат цели таблетки!**

*Лекарствени взаимодействия*

**СТОП-АЦИД** може да повлияе абсорбцията на други лекарства (като например тетрациклинови или хинолонови антибиотици, азитромицин, пропранолол, атенолол, каптоприл, итраконазол, фексофенадин, габапентин, алендронат). Моксифлоксацин трябва да се приема поне 4 часа преди или 8 часа след приема на Стоп-ацид.

Като правило **СТОП-АЦИД** да се приема 2 часа преди или след приема на други лекарства.

*Какви нежелани ефекти могат да се появят*

● При спазване на препоръчаната доза не се наблюдават нежелани ефекти.

*Бременност и кърмене*

Не са отбелязани нежелани ефекти при употребата на подобни продукти върху бременни и кърмещи жени.

*Срок на годност и съхранение*

5 (пет) години от датата на производство

Да се съхранява при стайна температура в оригиналната опаковка, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

*Опаковка*

20 броя таблетки в пластмасова банка.

20 броя таблетки в 1 блистер.

*Производител и притежател на разрешението за употреба*

СД “Панацея 2001”

ул. Гъльбец № 2

София, България

Дата на последна актуализация на текста: ноември 2003

