

Информация за пациента

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 23.11.04

Синекод® / Sinecod®

10 таблетки с удължено освобождаване / 10 prolonged release tablets

Тази листовка Ви предоставя полезна информация за Вашето лекарство. Моля, прочетете я внимателно, преди да започнете да го приемате. Ако имате допълнителни въпроси, обрнете се към Вашия лекар или фармацевт.

1. Какво е Синекод®?

Синекод® таблетки с удължено освобождаване съдържа 50mg Butamirate citrate като активна съставка.

Помощни вещества: ядро: аеросил 200, повидон K 30, хидрогенирано рициново масло, магнезиев стеарат, хидроксипропил-метилцелулоза; еудрагит L 30 D, лактозаmonoхидрат, винена киселина.

Обвивка: E127, титанов диоксид, E 172, полисорбат 80, талк, лактоза, еудрагит NE 30 D.

2. Как действа Синекод®?

Синекод® се използва за симптоматично лечение на непродуктивна кашлица, за потискане на кашлицата преди и след хирургични процедури и бронхоскопия.

3. Преди да вземете Синекод®

Не използвайте Синекод®:

Ако сте алергични към някоя от съставките му

Ако сте бременна или кърмите:

Както при други лекарства, консултирайте се с Вашия лекар, преди да вземете Синекод®, ако сте бременна или кърмите.

4. Как да използвате Синекод®?

Дозировка за възрастни и деца над 12 години:

Деца над 12 години: 1 или 2 таблетки дневно.

Възрастни: 2 или 3 таблетки дневно - в рамките на 8 или 12 часови периоди. Да се погълнат цели.

Какво да правим, ако е погълнат твърде много Синекод®?

Консултирайте се с Вашия лекар в случай на предозиране.

5. Какви нежелани ефекти би могъл да има Синекод®?

Едновременно с желаните си ефекти едно лекарство може да предизвика у някои хора и нежелани ефекти. Синекод® има добра поносимост. В много редки случаи може да се появят световъртеж, кожни обриви, гадене и диария. Тези оплаквания изчезват веднага след намаляване на дозата или спиране на терапията.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някой друг ефект, който смятате, че може да е свързан с употребата на Синекод®.

6. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини – няма

7. Допълнителна информация

Условия на съхранение:

Да се съхранява под 25°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Срок на годност

Не използвайте Синекод® след срока на годност, отбелязан на опаковката.



Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Производител:

Novartis Saglik Gida ve Terim, TR-80640 4 Levent-Istanbul, Turkey

Последна редакция на листовката: януари 1998 г.

