

ТЕРТЕНСИФ® SR

ТЕРТЕНСИФ SR
Филмирани таблетки с удължено освобождаване

Състав

• **Активна съставка:**
Fudaparamide..... 1.5mg
За една таблетка

• **Помощни вещества:** анхидриден колоиден силикат, хипромелоза, лактозен монохидрат, магнезиев стеарат, повидон, глицерол, макрогол 6000, титанов оксид.

Лекарствена форма и съдържание
Бели, кръгли, филмирани таблетки с удължено освобождаване.
Кутия от 30 филмирани таблетки в блистер (PVC/Алуминий).

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба и производителя:

Притежател на разрешението за употреба

Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
France

Производител

Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy - France

Фармакотерапевтична категория
Антихипертензивен диуретик
(С: сърдечносъдова система)

Терапевтични показания
Това лекарство се предписва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония).

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО

Противопоказания

- свръхчувствителност към сулфонамиди
- тежка бъбречна недостатъчност
- сериозни чернодробни заболявания
- хипокалемия (абнормално намаляване на нивата на плазмения калий)
Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба.

Предупреждения
Приемането на това лекарство трябва да бъде прекратено в случай на чернодробни заболявания.

Предпазни мерки

Използвайте внимателно това лекарство при следните случаи: нарушено водно/електролитно равновесие, подагра, диабет или бъбречни проблеми. Вашият лекар може да назначи лабораторни изследвания, за да наблюдава вашето лечение.
Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт.

Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействие

ТЕРТЕНСИФ SR не е желателно да се предписва при съпътстваща терапия с литиеви препарати или с някои лекарства, използвани при проблеми със сърдечния ритъм.
За да се избегнат евентуални взаимодействия между различни лекарства, трябва да информирате вашия



лекар, ако приемате някакви други медикаменти.

Бременност и кърмене
Информирайте вашия лекар ако сте бременна, желаете да забременеете или кърмите.

Като правило, по време на бременност или кърмене е препоръчително да поискате съвет от вашия лекар преди да вземете каквото и да било лекарство.

Ефект върху способността за шофиране и работа с машини

Индивидуални реакции във връзка с понижаването на кръвното налягане могат да се появят при някои пациенти. Поради това способността за шофиране и работа с машини може да бъде намалена.

Спортисти

Това лекарство съдържа активна съставка, която може да бъде причина за позитивна реакция при антидопинг контролен тест.

Списък на помощните вещества с установено действие или ефект

Глицерол: Може да бъде вреден във високи дози. Може да причини главоболие, стомашно разстройство и диария.

Лактоза: Този лекарствен продукт съдържа 0.125 g лактоза. Когато се взема следвайки предписанието, всяка доза доставя до 0.125 g лактоза. Не се препоръчва за пациенти с лактазен дефицит, галактоземия или синдром на нарушено усвояване на глюкоза/галактоза.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Дозировка

Една таблетка на ден
Винаги стриктно спазвайте лекарското предписание.

Начин на приемане

Прилага се перорално.

Начин, честота и време на приемане

Само една доза за 24 часа, препоръчително

сутрин, предвид диуретичния ефект на лекарството, с цел да се избегне необходимостта от няколкократно ставане през нощта.

Какво да се направи в случай, че една или няколко дози са били пропуснати
Да не се взема двойна доза, за да се компенсира забравената индивидуална доза.

Предозиране

В случай на случайно или преднамерено предозиране се консултирайте незабавно с лекар.

Нежелани ефекти

Това лекарство може да доведе до нежелани ефекти при някои хора. Тези ефекти са:

- Чувство за уморяемост (астения),
- Алергични прояви, редки случаи на кожни обриви,
- Световъртеж при бързо преминаване в изправено положение,
- Повишен риск от дехидратиране при пациенти в напреднала възраст или при сърдечна недостатъчност.

Съобщете на вашия лекар или фармацевт за всеки нежелан или обезпокояващ ви ефект, който не е описан в настоящата листовка.

Изменения в някои кръвни параметри могат да се появят особено при по-възрастни пациенти или при такива, с непълноценно хранене.

Вашият лекар може да поиска лабораторни тестове с цел наблюдаване на тези параметри.

Условия на съхранение и срок на годност
Няма специални условия на съхранение.

Да не се приема след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.
Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Дата на последната редакция на листовката за пациента
09.2004

