

● **ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

● **ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА**



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 14.09.09

Прочетете внимателно листовката преди да започнете лечението с това лекарство.

- **Пазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.**
- **Ако имате въпроси, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.**
- **Това лекарство е изписано лично на Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.**

В листовката може да прочетете

1. Какво е ЕРИУС (AERIUS) и за какво се използва.
2. Преди да започнете лечение с ЕРИУС (AERIUS).
3. Как се използва ЕРИУС (AERIUS).
4. Възможни нежелани лекарствени реакции.
5. Съхранение на ЕРИУС (AERIUS).

Име на лекарствения продукт

AERIUS 5 mg film tablets

ЕРИУС 5 mg филмирани таблетки

desloratadine

- **Активната съставка е: desloratadine 5 mg.**

- **Помощните вещества са: калциев хидроген фосфат дихидрат, микрокристална целулоза, царевично нишесте, талк. Обвивката на таблетката съдържа филмово покритие (включващо монохидратна лактоза, хидроксиметилпропилцелулоза, титаниев диоксид, ПЕГ 400, индиготин (Е 132)), същинска обвивка (включваща хидроксиметилпропилцелулоза, ПЕГ 400), карнаубски восък, бял восък.**

Притежател на разрешението за употреба:

SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgium.

Производител:

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, B-2220, Heist-op-den-Berg, Belgium.

1. КАКВО Е ЕРИУС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Ериус 5 mg филмирани таблетки в опаковки, съдържащи блистери от 7, 10, 30, 50 и 100 таблетки.

Ериус е противоалергично лекарство, което не Ви кара да се чувствате сънлив. Помага Ви да контролирате Вашата алергична реакция и нейните симптоми.

Ериус облекчава симптомите на алергичния ринит (например сенна хрема, алергия към домашна прах) като кихане, секреция от носа, сърбеж в носа, сърбеж на небцето, а също така сълзене, зачеряване и сърбеж в очите.

Ериус също така се използва за облекчаване на симптомите, свързани с хронична идиопатична уртикария, като сърбеж и обриви (копривна треска).

Облекчаването на тези симптоми продължава цяло денонощие и Ви помага да извършвате обичайните си ежедневни дейности и да спите спокойно.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С ЕРИУС

Не използвайте Ериус - ако проявявате свръхчувствителност (алергия) към desloratadine или някоя от другите съставки на Ериус или към лоратадин.

Ериус се прилага при възрастни и деца (над 12 години).

Прием на Ериус с храна и напитки

Ериус може да се приема независимо от храненето.

Бременност

Ако сте бременна не се препоръчва приемането на Ериус. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди започване на лечение с какъвто и да е лекарствен продукт по време на бременност.



Кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете лечение с каквото и да е лекарство.

Ако кърмите дете, приемът на Ериус не е препоръчителен.

Шофиране и работа с машини

В препоръчваните дози Ериус не предизвиква унесеност и не намалява концентрацията. В много редки случаи отделни пациенти могат да изпитат лека сънливост, която може да повлияе способността им за шофиране и работа с машини.

~~Нито оказва влияние върху способността Ви да шофирате или работите с машини.~~

Прием на други лекарства

Досега не са установени взаимодействия на Ериус с други лекарства.

3. КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ЕРИУС?

Инструкции за правилна потреба

За възрастни и деца (над 12 години): по една таблетка веднъж на ден.

Изпийте таблетката цяла с вода, независимо от приема на храна.

Приемайте таблетките толкова дълго, колкото Вашия лекар Ви предпише.

Ако изпиете повече от необходимото количество Ериус

Използвайте Ериус само така, както е предписано на Вас. При случайно предозиране не се очакват сериозни проблеми. Въпреки това, ако изпиете по-голямо от предписаното Ви количество Ериус, консултирайте с Вашия лекар или фармацевт .

Ако забравите да вземете Ериус

Ако забравите да изпиете дозата си навреме, изпийте я възможно най-рано след като си спомните; след това продължете лечението по предписаната Ви схема. Не взимайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички останали лекарства Ериус може да има нежелани реакции. Нежеланите реакции при възрастни са същите както при прием на таблетки от обикновена захар. Въпреки това малко по-често са наблюдавани отпадналост, сухота в устата и главоболие в сравнение с таблетките от захар.

В постмаркетинговия период на Ериус случаи на тежки алергични реакции (затруднение при дишане, свиркащо дишане, сърбеж, ларингит и подуване) и обрив са били докладвани много рядко. Случаи на сърцебиене, учестен пулс, стомашна болка, гадене (чувство за повръщане), повръщане, разстроен стомах, диария, сънливост и ненормална чернодробна функция са докладвани много рядко.

Ако забележите каквото и да било нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕРИУС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява при температура под 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Съобщете на Вашия фармацевт, ако забележите промяна във външния вид на таблетките.

Дата на последна редакция на текста

Юли 2003 г.

За пълна информация, свързана с този лекарствен продукт се обръщайте към представителството на притежателя на разрешението за употреба в България.



Schering - Plough Central East AG клон България, Ул. "Мати Рубенова" № 7
София 1504

