

ИАЛ  
ОДОБРЕН ОI  
ДАТА ...15-03-05г.

## Информация за пациента

### Vigantol® Oil

Активна съставка: Cholecalciferol

#### Състав

1 ml от разтвора / = около 30 капки / съдържа 0.5 mg cholecalciferol, еквивалентен на 20 000 IU витамин D<sub>3</sub>.

#### Показания

- Профилактика на рахит при кърмачета( нарушения в отлагането на калциеви соли в костите, причинено от липса или недоимък на витамин D)
- Профилактика на предполагаем риск от заболяване, причинено от недостатъчност на витамин D
- Профилактика на симптомите на дефицит при синдром на малабсорбция( намалено погъщане на веществата), напр. дължаща се на хронични чревни заболявания, жътчна цироза на черния дроб, обширна резекция на гастроинтестиналния тракт ( изрязване на част от стомаха и червата)
- Лечение на рахит и остеомалация (размекване на костите при възрастни) , индуцирани от дефицит на витамин D
- Поддържащо лечение на остеопороза( намаляване на плътността на костното вещество в костта)
- Лечение на хипопаратиреоидизъм и псевдохипопаратиреоидизъм (намаляване на функцията на околощитовидните жлези).

#### Противопоказания

При повищено съдържание на калций в кръвта и/или в урината Vigantol Oil не трябва да се прилага.

Относно прилагането на Vigantol Oil се препоръчват следните

#### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Проследяване на съдържанието на калций в кръвта и в урината при намалена двигателна активност ( напр. гипсови превръзки). При образуването на камъни в бъбреците или данни за образуване на такива в миналото, също се налага проследяване съдържанието на калций в кръвта и урината. Препоръчително е препаратът въобще да не се използва при наличието на бъбречни камъни. При наличието на саркоидоза( системно заболяване, засягащо кожата), Vitamin D<sub>3</sub> трябва да се дава само след внимателна преценка.



### Нежелани лекарствени реакции

Нежелани лекарствени реакции при Vigantol Oil по принцип би трябвало да не се появяват, когато препаратът се прилага в препоръчаната дозировка. Препаратът е доказал, че добре се понася от пациентите. При рядко срещаната свръхчувствителност към Vitamin D<sub>3</sub> или при предозиране на даден препарат, може понякога да се получи повишаване съдържанието на калций в кръвта и/или в урината. При продължително повишаване съдържанието на калций в кръвта може да се наблюдават следните симптоми:

Симптоми в острая стадий: нарушаване на сърдечния ритъм, гадене, повръщане;

Психични симптоми: нарушения на съзнанието

Симптоми в хроничен стадий: намаляване на теглото, образуване на бъбречни камъни, калцифициране на бъбреците, на меките части, липса на апетит, силна жажда, повишено отделяне на урина. В отделни случаи има описани смъртоносни резултати.

### Специални указания

При пациенти със саркоидоза, с имобилизация и които провеждат курс на лечение с тиазиди, трябва да се подхожда с особена предпазливост.

### Взаимодействия с други препарати

При едновременното приемане с тиазиди /средства стимулиращи отделянето на урина/ се повишава риска от поява на хиперкалциемия. Само в изключителни случаи и при контролиране на серумния калций, Vitamin D<sub>3</sub> може да комбинира с препарати, които имат подобно на Vitamin D<sub>3</sub> действие /т.н. метаболити или аналогични на Vitamin D препарати/.

### Дозировка

Ако няма предписана определена доза, за профилактика на ра�ахит, кърмачетата получават дневно 1-2 капки, като трябва да са навършили поне две седмици / нормално родени кърмачета – около 500 единици на ден; при по-особени случаи, напр. преждевременно родени – 1000 единици на ден/. По принцип за профилактика на ра�ахита през първата година от живота на детето са необходими две опаковки от Vigantol Oil. През втората година от живота на детето са необходими обикновено нови дози – 1 капка дневно Vitamin D<sub>3</sub>, особено през зимните месеци.

За предотвратяване на остеомалация възрастните вземат обикновено по 1-2 капки, като продължителността на лечението трябва да се определи от лекар.



Необходимата доза от вит.D<sub>3</sub> за лечение на рахит и остеомалация се определя от лекуващия лекар, в зависимост от тежестта на заболяването.

При лечение на хипопаратиреоидизъм и псевдохипопаратиреоидизъм:  
10 000 – 20 000 единици на ден / проследяване на съдържанието на калций в серума на всеки 3-6 месеца и адаптиране на дозата съобразно тези стойности/.

#### **Начин и продължителност на приложението**

На кърмачетата и на малките деца капките се дават в лъжица с мляко или каша. Не се препоръчва капките да се поставят в предвиденото ядене за детето, тъй като може да не се усвои ефективно количеството от препарата. По-големите деца и възрастните приемат Vigantol Oil в лъжица течност.

Лекарството не бива да се използва след изтичане срока на годност.

Лекарството трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Производител: Merck KGaA, Darmstadt, Germany

#### **Допълнителни указания**

##### **Внимание!**

Различният обем на съдържанието в шишетата може понякога да породи у Вас съмнението, че не получавате отбелязаното на етикета количество. Пълненето се осъществява под постоянен контрол, така че е изключено да получите по-малко количество от това, което сте закупили. Под влияние на студа, разтворът може да е станал мътен и да се е втвърдил, затова потопете шишето в топла вода и разтворът ще стане отново течен и бистър.

#### **Указания за използване на шишето с капкомер**

За да получите точно необходимата доза, трябва да държите шишето перпендикулярно при капане.

#### **Форма и големина на Vigantol Oil**

Шише с капкомер с 10 ml перорален разтвор.

#### **Дата на последна редакция**

Април 1997г.

