

SOPHARMA

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля прочетете внимателно тази листовка. Тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ стоматолог.

XYLODREN blue

КСИЛОДРЕН син

Активни вещества: Лидокаин, епинефрин и норепинефрин
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНА
ГРУПА

Ксилодрен син под формата на инжекционен разтвор е стоматологичен продукт.

ПОКАЗАНИЯ

В кои случаи може да се прилага Ксилодрен син?

В стоматологичната практика за предизвикване на проводна анестезия (упойка).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В кои случаи не трябва да се прилага продукта?

Не се прилага при свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта, миастения гравис (болестна мускулна слабост), сърдечно-съдова недостатъчност, хипертиреозидизъм (повишена

активност на щитовидната жлеза), повишено кръвно налягане, съдови нарушения, метхемоглобинемия (увреждане на хемоглобина).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Кога продукта може да се прилага с повишено внимание?

Да се прилага внимателно при възрастни пациенти, страдащи от сърдечно-съдови, бъбречни и чернодробни заболявания; при повишена температура.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продуктът съдържа като помощни вещества натриев метабисулфит и динатриев едетат. Натриевият метабисулфит може да причини алергичен тип реакции, включително анафилактични симптоми и бронхоспазъм при чувствителни пациенти, особено тези с анамнестични данни за бронхиална астма или алергия. Динатриевият едетат може да причини алергични реакции.

Да се избягва приложение в първите три месеца на бременността и да се прилага с внимание през останалото време на бременността и кърменето, след строга преценка на съотношението полза/риск от страна на лекаря.

След приключване на стоматологичната процедура е необходимо повишено внимание при управление на моторни превозни средства и работа с машини, а при възможност избягване на използването им.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Трябва да информирате Вашия лекуващ стоматолог в случай на каквото и да било съпътстващо лечение с други лекарствени продукти,

с оглед да бъде избегнато евентуално взаимодействие между продуктите.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Дозировката на продукта се определя от Вашия лекуващ стоматолог.

Продуктът се прилага за предизвикване на проводна анестезия по 1-2 ампули. Анестезията настъпва след 5-10 минути и продължава около 1-2 часа.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Какви нежелани реакции могат да настъпят при прилагането на Ксилодрен син?

Макар и рядко, при чувствителни пациенти могат да се наблюдават алергични реакции, нарушение на зрението, скованост и по-продължително изтръпване на устните, сънливост, гадене, повръщане.

За всички нежелани лекарствени реакции, включително и неописани в листовката, пациентът трябва незабавно да съобщи на своя лекуващ стоматолог.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

В оригинална опаковка на защитено от светлина място при температура под 25⁰ С. Да не се замразява!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

Три години от датата на производство.

Да не се употребява след изтичане срока на годност!

СЪСТАВ

Съдържание на една ампула 2 ml:

Активни вещества:

Лидокаинов хидрохлорид	0,040 g
Епинефрин	0,00004 g
Норепинефрин	0,00004 g

Помощни вещества: Солна киселина разредена 1 mol/l, натриев ацетат, ледена оцетна киселина, натриев метабисулфит, натриев хлорид, динатриев едетат, вода за инжекции.

ДАНИИ ЗА ОПАКОВКАТА

Продуктът се пълни в ампули от безцветно стъкло от 2 ml. Десет ампули се поставят в блистер от твърдо ПВХ фолио. Един или пет блистера се поставят в единична картонена кутия заедно с листовка с указания за употреба.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

СОФАРМА АД, България

София, ул. "Илиенско шосе" N 16

Дата на последната актуализация на листовката

09.07.2001 г.