


## Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно тази информация преди да започнете лечение с лекарството!

EUNERVINA®  
ЕУНЕРВИНА®  
сироп 125 ml



### СЪСТАВ

Лекарствени вещества в 10 ml сироп (1 мерителна чашка):

Sodium bromide 175 mg, Ammonium bromide 233 mg, Potassium bromide 350 mg, Tinctura Valerianaе 583 mg.

Помощни вещества: сорбитол, захарин натрий, ментол, глицерол, лимонена киселина, безводна; рициново масло, хидрогенирано; етанол 96%, натриев бензоат, ароматизатор, пречистена вода.

### ДЕЙСТВИЕ

Еунервина е комбиниран лекарствен продукт със седативен (успокояващ) ефект, дължащ се на съдържащите се бромиди (натриев, калиев и амониев) и тинктура валериана. Лекарствените съставки взаимно усилват действието си, като потискат двигателния център в мозъчната кора и усилват процесите на задържане в централната нервна система.

### ПОКАЗАНИЯ

*В какви случаи се употребява Еунервина?*

Неврози с различен произход, особено в климактериума; леки нарушения на съня, свързани с невроза; в комбинираното лечение на функционалните сърдечно-съдови нарушения и на невротичен синдром при някои психози.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

*В какви случаи не трябва да се употребява Еунервина?*

- Свръхчувствителност към някое от лекарствените или помощните вещества;
- Тежки нарушения на чернодробните и бъбречните функции;
- Деца на възраст под 16 години;
- Бременност и кърмене.

### СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- При пациенти на безсолна диета може да се засили ефекта на бромидите, влизащи в състава на сиропа, поради удължаване времето на отделянето им от организма.
- Продължителната употреба на бромиди води до натрупването им в организма и до поява на нежелани лекарствени реакции. Особено чувствителни са пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност; както и пациенти над 65-годишна възраст.
- При появя на кожни и невропсихични нарушения е необходимо лечението с Еунервина да се прекрати.
- Поради отделянето на бромидите чрез жлезите с външна секреция е необходимо да се поддържа добра хигиена на кожата, устната кухина и редовна дефекация.
- Лекарственият продукт съдържа 3,5 г сорбитол в 10 мл сироп. Сиропът е неподходящ при вродена непоносимост към фруктоза. Може да причини стомашно дразнене и диария.



- Еунервина сироп съдържа 6,16 об.% етанол. В 10 мл сироп се съдържат 0,5 г етанол. Може да представлява опасност за пациенти с чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания, както и за бременни. Може да промени или засили действието на други лекарства.
- В сиропа се съдържа глицерол, който във високи дози може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария.
- Като помощно вещество се съдържа рициново масло (50 mg в 10 ml сироп). Рициновото масло може да предизвика стомашен дискомфорт и диария при високи дози и чувствителни пациенти.

#### **Употреба при бременност и кърмене**

По време на бременност и в периода на кърмене приложението на Еунервина е противопоказано.

#### **Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Лекарствените вещества в Еунервина оказват седативен ефект, поради което съществува риск от намаляване на активното внимание и забавяне на реакциите. Сиропът трябва да се използва с внимание при шофиране и работа с машини.

#### **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

*При лечение с други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепт, е необходимо да информирате лекуващия лекар за това, тъй като някои от тях могат да си взаимодействат неблагоприятно с Еунервина*

- При пациенти на безсолна диета се засилва ефекта на бромидите.
- Лекарства, съдържащи дигиталисови гликозиди, ергоалкалоиди, алкалоиди на беладона и морфин могат да намалят ефекта на Еунервина.
- При едновременна употреба с Еунервина може да се засили действието на сънотворните, алкохола и на други лекарства, които действат успокояващо на централната нервна система.
- Не се препоръчва употреба на алкохол по време на лечение с Еунервина.

#### **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

*Дозировката, продължителността на лечение и интервалите на дозиране се определят от лекуващия лекар.*

Начин на приложение - перорално.

Възрастни и деца над 16 г: по 1 мерителна чашка (10 ml) 3-4 пъти дневно.

Продължителност на лечението - не повече от 3 седмици.

#### **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Обикновено Еунервина се понася добре от пациентите. При продължителен прием на сиропа се повишава опасността от поява на хронично бромидно отравяне. Симптомите са следните: повдигане, повръщане, диария, стоматит, гастроентероколит; нарушения на речта, намалени паметови възможности, сънливост, раздразнителност, треперене; хрема, бронхит; конюнктивит; бромово акне, кожни обриви; забавена сърдечна честота.

*Съобщавайте на лекуващия лекар за всички наблюдавани от Вас нежелани реакции, дори и такива, които не са включени в листовката!*

#### **ПРЕДОЗИРАНЕ**

В случай, че сте приели дози, значително надвишаващи предписаните, уведомете лекуващия лекар, който при нужда ще назначи съответното лечение.

#### **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Сироп по 125 ml в тъмна стъклена бутилка с алуминиева капачка, чашка и листовка в картонена кутия.



**СЪХРАНЕНИЕ**

В оригиналната опаковка, на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

**СРОК НА ГОДНОСТ**

2 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката!

Сиропът може да се използва до 1 месец след отваряне на бутилката!

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ**

СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16

**ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА**

Април 2004 г.

