

ИАЛ  
ОДОБРЕН ОТ  
ДАТА 15.07.03

листовка за пациентта

Уважаеми пациенти,

- Моля прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете употребата на лекарствения продукт.
- Пазете тази листовка, Вие може да поискате да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

®**ALERGOFTAL**  
(АЛЕРГОФТАЛ)  
капки за очи, разтвор 10ml

**Състав(Какво съдържа лекарствения продукт?):**

Един милилитър от лекарствения продукт съдържа следните лекарствени вещества:

Antazoline phosphate (антазолин фосфат) 5 mg

Naphazoline Hydrochloride (нафазолин хидрохлорид) 0.25 mg

и

**помощни вещества:**

бензалкониев хлорид (като консервант), макрогол 8000, поливинилов алкохол, натриев хлорид, натриев хидроксид и/или солна киселина (за кор.на pH) и пречистена вода.

**Свойства:**

**ALERGOFTAL** съчетава антихистаминовия (противоалергичен) и деконгестивния (свиващ кръвоносните съдове) ефект на двете лекарствени вещества.

**Лекарствена форма и опаковка:**

**ALERGOFTAL** е капки за очи, разтвор и се доставя в пластмасови флакони от 10 мл.

**Притежател на разрешението за употреба и производител:**

ALCON CUSI, S.A.

Camil Fabra, 58

08320 El Masnou - Barcelona, Spain

**Показания(За какво се използва лекарствения продукт?):**

За облекчение на симптомите на алергичните конюнктивити (леко дразнене, зачеряване, конгестия).

**Противопоказания(Кога трябва да се избягва употребата на лекарствения продукт?):**  
Свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарствения продукт. Пациентите с доказана закритоъгълна глаукома трябва да се консултират с лекуващия лекар преди да започнат употребата на **ALERGOFTAL**.

**Предупреждения и специални предпазни мерки:**

- Ако състоянието Ви се влошава или няма никакво подобреие до 72 часа – трябва да се консултирате с лекар.
- Ако в следствие на употребата на лекарствения продукт усетите болка в окото, главоболие, замъглено зрение, промени в зрението или чувствителност към светлината, незабавно преустановете употребата и се консултирайте с вашия лекар.



- Да се прилага внимателно при пациенти, използващи като антидепресанти моноамино-оксидазни инхибитори.
- Лекарственият продукт съдържа като консервант бензалкониев хлорид. Затова меките контактни лещи трябва да се отстроят непосредствено преди приложението на ALERGOFTAL и могат да се сложат обратно в очите 20 минути след накапването.

**ВНИМАНИЕ:** Пациентите, страдащи от хипертензия (повишено кръвно налягане), хипертироидизъм (аномалии във функцията на щитовидната жлеза), сърдечни болести и диабет трябва да се консултират с лекувания лекар преди да започнат употребата на ALERGOFTAL.

**Лекарствени взаимодействия:**

- Ако използвате за лечение моноамино-оксидазни инхибитори (антидепресанти) е необходимо да се консултирате с вашия лекар.
- Преди да използвате други капки за очи едновременно с ALERGOFTAL се консултирайте с вашия лекар или фармацевт. Ако това е възможно, изчакайте поне 5 минути и едва тогава капнете от другите капки за очи.

**Употреба при бременност и кърмене:**

Лекарственият продукт трябва да се употребява след консултация и по преценка на лекувания лекар.

**Употреба при деца:**

Лекарственият продукт трябва да се употребява след консултация и по преценка на лекувания лекар при деца.

**Ефекти върху способността за шофиране и при работа с машини:**

До този момент няма данни за вероятен ефект на ALERGOFTAL при тези обстоятелства.

**Дозировка:**

Възрастни: Ако не е предписано друго обичайната дозировка е 1-2 капки един до четири пъти дневно, в зависимост от тежестта на симптомите.

**Инструкции за правилна употреба:**

- Наклонете глава назад. Разтворете долния клепач, погледнете нагоре и накапете капките в конюнктивния сак (пространството между окото и клепача).
- Затворете окото/очите внимателно и ги задръжте затворени за няколко секунди.
- Изчакайте поне 5 минути преди да използвате каквото и да е друго лекарство за очно приложение.

Лекарственият продукт е стерилен и е необходимо да се следват следните препоръки:

- Този лекарствен продукт не трябва да се използва от повече от един човек.
- Поставянето на капките трябва да се извърши при максимално хигиенни условия (винаги мийте ръцете си и избягвайте контакта с върха на апликатора – флакончето).
- Затваряйте добре флакончето след употреба.



- Изхвърлете флакончето (с останалото съдържание) при завършване на лечението.
- Не използвайте лекарствения продукт повече от 4 седмици след първоначалното отваряне или ако забележите някакви промени в цвета или мътността на разтвора.

#### **Предозиране:**

При локално прилагане в окото - в указаната дозировка не се очаква поява на токсични ефекти. При случайно погъщане на съдържанието на флакона, особено при деца, незабавно се консултирайте с лекар.

#### **Нежелани лекарствени реакции:**

Лекарственият продукт обикновено не предизвиква нежелани лекарствени реакции ако се използва в препоръчата доза.

Понякога е възможно да настъпи разширение на зениците, повишаване на вътрешното налягане, както и поява на общи нежелани лекарствени реакции (повишаване на кръвното налягане, сърдечна аритмия).

В много редки случаи е възможно да настъпят и някои локални (в окото) нежелани лекарствени реакции, като: преходно дразнене, алергични реакции.

В случай, че настъпят някои от изброените или други неописани нежелани лекарствени реакции, е необходима консултация с вашия лекуващ лекар или фармацевт.

#### **Условия на съхранение:**

- Да се съхранява при температура до 30°C, на места недостъпни за деца.
- Съдържанието на флакона не трябва да се използва повече от четири седмици след първоначалното отваряне.
- Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарственият продукт е вписан в регистъра на ИАЛ под №: 9800123.

**ALERGOFTAL** капки за очи се отпуска без лекарско предписание в аптеките.

