

И А Л
ОДОБРЕН
ДАТА 31.01.06г.

Информация за пациента

Тера Флу[®] Простуда и Грип /Thera-Flu[®] Cold and Flu Прах за перорален разтвор в сашета x 10/Powder for oral solution in Sachet x 10

Тази листовка Ви предоставя полезна информация за Вашето лекарство. Моля, прочетете я внимателно, преди да започнете да го приемате. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

1. Какво представлява Тера Флу[®] Простуда и Грип?

Всяко саше Тера Флу[®] Простуда и Грип съдържа следните активни съставки: 325 mg Paracetamol, 10 mg Phenylephrine hydrochloride и 20 mg Pheniramine hydrogenc maleate. В сашетата са включени и следните помощни вещества: захароза, калиев ацесулфам, D&C Yellow № 10, FD&C Yellow № 6, малтодекстрин, силикон диоксид, лимонова есенция, лимонова киселина, натриев цитрат, калциев фосфат.

Във всяко саше се съдържат 42 mg натрий.

2. Как действа Тера Флу[®] Простуда и Грип?

Тера Флу[®] Простуда и Грип е комбинация от следните съставки: парациетамол – с температуропонижаващо и болкоуспокояващо действие, фенирамин малеат – антихистамин, който спира секрецията от носа, и фенилефрин хидрохлорид – деконгестант с отбъбващ ефект върху носната лигавица.

Активните съставки на Тера Флу[®] Простуда и Грип действат заедно за краткосрочно лечение на съпровождащите симптоми при грип и простудни заболявания, включващи:

- висока температура и втисане;
- болки в тялото;
- главоболие;
- запущен нос;
- кихане и секреция от носа.

Тера Флу[®] Простуда и Грип се предлага в кутии по 10 сашета, всяко от които представлява еднократна доза и съдържа прах за орален разтвор с вкус на лимон. Отпуска се без рецепт.

3. За какво се използва Тера Флу[®] Простуда и Грип?

Тера Флу[®] Простуда и Грип осигурява краткосрочно понижение на високата температура, облекчава симптомите като втисане, болки в тялото, главоболие, запущен нос, кихане и секреция от носа при грип и простудни заболявания. Приема се разтворен в топла вода и има вкус на лимон.

4. Преди да използвате Тера Флу[®] Простуда и Грип

Не приемайте Тера Флу[®] Простуда и Грип, ако:

- Сте алергични към някоя от съставките.
- Сте приемали моноаминооксидазен инхибитор (МАОИ) през последните две седмици (МАОИ включват медикаменти, използвани за лечение на депресия, психични или емоционални състояния, или болест на Паркинсон). Ако не сте сигурни дали предписаните ви лекарства съдържат МАОИ, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
- Приемате други медикаменти, съдържащи парациетамол.
- Имате белодробно заболяване (включително астма).
- Страдате от недостиг на глукозо-б-фосфат дехидрогеназа (G-6PD).



- Този лекарствен продукт съдържа 13.15 g захароза. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя до 13.15 g захароза (да се има предвид при диабетици). Неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарозно/изомалтазен дефицит.

Други медицински проблеми

Консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате Тера Флу[®] Простуда и Грип, ако имате някои от следните здравословни проблеми:

- - сърдечни болести, високо кръвно налягане, заболяване на щитовидната жлеза, диабет или глаукома;
- бъбречно заболяване;
- заболяване на черния дроб;
- епилепсия;
- трудно уриниране.

Какво друго трябва да помните при употребата на Тера Флу[®] Простуда и Грип

- Не използвайте медикамента в по-високи дози или по-дълго време от посоченото.
- Тера Флу[®] Простуда и Грип съдържа парacetamol, който може да увреди черния Ви дроб, ако се употребява в дози, по-високи от препоръчаните, или за по-дълъг период.
- Съставката за отпушване на носа фенилефрин, която се съдържа в Тера Флу[®] Простуда и Грип, може да предизвика фалшив положителен резултат от допинг-тестовете при спортсти.

Бременност и кърмене

Както за всички лекарства, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Тера Флу[®] Простуда и Грип.

Едновременна употреба на други лекарства

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате или насърко сте приемали други медикаменти. Това се отнася и за тези лекарства, които се отпускат без рецепт.

Шофиране и работа с машини

- Тера Флу[®] Простуда и Грип може да предизвика съниливост. Не шофирайте и не управлявайте машини, докато приемате лекарствения продукт.

Употреба на алкохол

- Не се препоръчва консумацията на алкохол по време на лечението с Тера Флу[®] Простуда и Грип, защото едновременната употреба на парacetamol и алкохол може да причини чернодробно увреждане.

5. Как да използвате Тера Флу[®] Простуда и Грип?

Възрастни и деца над 12 години: разтворете съдържанието на едно пакетче в чаша с гореща вода (приблизително 200 ml) и изпийте, докато още е топло. Дозата може да се повтори след 4-6 часа според необходимостта от облекчаване на симптомите, но да не се приемат повече от 3 дози за 24 часа.

Спреме употребата на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- Не почувствате облекчение на симптомите до 5 дни или поддържате висока температура.



- Кашлицата продължава повече от 5 дни, възвръща се или поддържате висока температура, появяват се кожен обрив или упорито главоболие.
- Имате персистиращо възпалено гърло повече от 2 дни и поддържате висока температура, главоболие, получавате кожен обрив, гадене или повръщате. Това може да са признания на сериозно заболяване.

Какво трябва да направите, ако сте пропуснали една доза?

Добре е лекарственият продукт да се приема на всеки 4 до 6 часа, докато симптомите са налице, но не по-дълго от 5 последователни дни. Ако сте пропуснали една доза, вземете я веднага щом се сетите, след което продължете лечението с нова доза след 4 часа, ако е необходимо.

Какво трябва да направите, ако сте приели твърде много Тера Флу[®] Простуда и Грип?

В случай на предозиране веднага се обрнете към Вашия лекар или фармацевт, дори да нямате никакви симптоми.

6. Какви нежелани ефекти може да има Тера Флу[®] Простуда и Грип?

Най-честите нежелани ефекти са слаби алергични кожни реакции, съниливост, гадене, виене на съят, сухота в устата или гърлото, умора, главоболие, безсъние, раздразнителност, тахикардия.

Възможни са стомашно-чревни нарушения, включващи запек, диария или подуване, понякога се срецват беспокойство и смущение на съня.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите никакви други нежелани ефекти.

7. Как да съхранявате Тера Флу[®] Простуда и Грип?

Условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 25 °C.

8. Допълнителна информация

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелаязан на опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Производител

Patheon Inc., Whitby Operations, 111 Consumers Drive, Whitby, Ontario, Canada

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Consumer Health SA, Nyon, Switzerland

Последна редакция на листовката

Май 2003 г.

