

Листовка за пациента

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 17-01-06г.

Budesonid forte
Будезонид форте

Тази листовка се отнася само за Budesonid forte. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. Тя ви информира за най-важното относно Budesonid forte. За повече информация или съвет се обърнете към вашия лекар.

1. Име на лекарството

Името на лекарството е **Budesonid forte (Будезонид форте)**.

2. Какво представлява и какво съдържа Budesonid forte

Budesonid forte представлява херметически затворена метална опаковка, която съдържа лекарството и е поставена в инхалаторно устройство с пулверизатор (инхалер). Чрез инхалера лекарството се впърскава директно в дихателните пътища. Всяка опаковка Budesonid forte съдържа 200 дозирани впърсквания, като всяко едно впърскване доставя 200 µg (микрограма) от лекарственото вещество – budesonide (будезонид). Съдържат се и следните помощни вещества: сорбитан триолеат, пречистен соев лецитин, трихлорофлуорометан и дихлорофлуорометан.

3. Кой произвежда лекарството и притежава разрешението за употреба

Budesonid forte се произвежда от GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, Poznan, Poland. Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK с представител в България GlaxoSmithKline ЕООД, София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл.10.

4. Как действа лекарството

Budesonid forte е от групата лекарства, наречени кортикоステроиди. Те се прилагат за лечение на бронхиална астма, тъй като притежават мощно противовъзпалително действие. Budesonid forte намалява набъбването и дразненето на стените на малките въздухносни пътища в белите дробове и по този начин облекчава дишането.

5. За какво се използва Budesonid forte

Budesonid forte се използва за лечение и профилактика на бронхиална астма при възрастни.

6. Какво трябва да имате предвид преди започване на приема

Преди да започнете приема, проверете дали употребата на Budesonid forte е правилна във вашия случай и дали Budesonid forte е лекарство, подходящо за вас.

Ако отговорите с "да" на някой от следните въпроси, уведомете лекаря за това, преди да започнете да приемате лекарството:


- Имати ли сте някога прояви на алергия или повишенна чувствителност към budesonide или към някоя друга от съставките на продукта?
- Бременна ли сте, опитвате ли се да забременеете?
- Кърмите ли?
- Страдате ли от заболявания на ларингса? Имати ли сте в миналото внезапна загуба на гласа?
- Имати ли сте някога млечница (кандидоза) в устата?
- Лекували ли са ви някога от туберкулоза?

Важно е да уведомите лекаря за всички други лекарства, които приемате в момента или сте приемали наскоро, дори за тези, които сте си купили без лекарско предписание.

Budesonid forte не се използва за овладяване на астматичен пристъп! Лекарството е предназначено за продължително поддържащо лечение с цел предотвратяване на появата на пристъпи. За овладяване на пристъп се използва краткодействащ бронходилататор (напр. salbutamol).

Необходимостта от повишаване на дозата на краткодействащия бронходилататор означава, че поддържащата терапията не е достатъчна за контролиране на заболяването.

М. С.
13.02.06



Смущение в растежа при деца и подрастващи може да бъде наблюдавано в хода на лечението. Такива пациенти трябва да бъдат проследявани чрез редовни измервания на ръста и теглото.

Необходимо е специално внимание при преминаване от перорално към инхалаторно лечение на астма:

Възстановяването на влошената надбъбречна функция, причинено от дълготрайната системна кортикостероидна терапия отнема определено време. При пациенти лекувани дълго време или с високи дози системни кортикостероиди, може да се подтисне надбъбречната функция. При тях намаляването на дозата перорален кортикостероид трябва да става внимателно, в интервали не по-кратки от една седмица, а функцията на надбъбречните жлези да се следи редовно. Тези пациенти трябва да бъдат под строго лекарско наблюдение по време на лечението с инхалаторен кортикостероид в стресови ситуации (при пристъпи, респираторни инфекции, обща слабост, травми, хирургични интервенции и др.).

Пероралното кортикостероидно лечение подтиска алергични изяви като алергичен ринит или екзема. Преминаването към инхалаторно кортикостероидно лечение може да ги отключи. Тези състояния се лекуват симптоматично с антихистаминови и/или кортикостероидни продукти за локално приложение.

Ако сте бременна:

Няма достатъчно данни за безопасността на лекарственото вещество budesonide при бременни.

Лечението с Budesonid forte по време на бременност трябва да става, само ако очакваните ползи от лечението на майката са по-големи от възможните рискове за бебето.

Ако кърмите:

Няма данни дали Budesonid преминава в млякото при кърмачки. Въпреки инхалаторният начин на приложение, използването на лекарството при кърмещите жени трябва да се съобрази с възможните рискове за бебето.

Взаимодействия с други лекарства

Непременно уведомете лекаря за всички други лекарства, които приемате в момента, дори за тези, които сте си купили сами без лекарско предписание.

За лекарствените вещества cimetidine (симетидин) и ketoconazole (кетоконазол) е известно, че могат да повлияят метаболизма на budesonide.

7. Как да приемате Budesonid forte

Приемайте лекарството, както лекуващият лекар ви е препоръчал. Лекарят определя дозировката и продължителността на лечението.

Важно е лекарството да бъде приемано точно в определеното време.

Трябва да приемате редовно Budesonid forte, дори и да нямате пристъпи на астма.

Ако лекарят не е предписал друго, обичайната дозировка на лекарството за възрастни е:

- начална доза - 400 µg до 1600 µg дневно, разделена на 2 до 8 приема.
- поддържаща доза - 200 µg до 400 µg дневно, разделена на 1 до 2 приема.

Ако не сте сигурни как да приемате лекарството, попитайте лекаря.

Препоръчва се след всяка инхалация устата да се изплакне с вода, а зъбите да се измият.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПРОВЕРКА НА ИНХАЛЕРА:

Преди да използвате инхалера за първи път или ако вашият инхалер не е бил използван в продължение на една седмица, или повече, отстранете капачката на апликатора за уста чрез внимателно състискане от двете страни, разкларате инхалера добре и пръснете един път във въздуха, за да се уверите, че работи.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНХАЛЕРА:

1. Отстранете капачката на апликатора за уста чрез внимателно притискане от двете страни и проверете отвътре и отвън дали апликаторът е чист.
2. Разкларате инхалера добре.
3. Дръжте инхалера между пръстите и палеца, като палеца поставите долу под апликатора.
4. Издишайте и след това поставете апликатора в устата си между зъбите и затворете устни около него, без да го захапвате.



5. Веднага след като започнете вдишването през устата, натиснете върха на инхалера, за да впръскате лекарството, като вдишвате продължително и дълбоко.
6. Докато задържате дъха си, извадете инхалера от устата и махнете пръста от върха на инхалера. Задръжте дъха си докато ви е възможно.
7. Ако трябва да поемете повече на брой дози, задръжте инхалера нагоре и изчакайте половин минута, след което повторете действията от т.2 до т.6.

Апликаторът за уста се затваря чрез силно притискане на капачката.



ВАЖНО!

Изпълнявайте възможно по-бавно действията от точки 4, 5 и 6. Важно е да започнете да вдишвате, колкото е възможно по-бавно точно преди задействането на инхалера.

Упражнявайте се пред огледало първите няколко пъти. Ако след инхиалиране видите капчици по вашия инхалер или отстрани по устните си, трябва да повторите приема.

Ако лекуващият лекар ви е дал други инструкции за употреба на инхалера, моля, спазвайте ги внимателно.

Хората със слаби ръце трябва да държат инхалера с двете ръце. Двата показалеца трябва да се поставят на върха му, докато двета палеца се държат върху основата под апликатора.

ПОЧИСТВАНЕ:

Вашият инхалер трябва да бъде почистван поне веднъж седмично по следния начин:

1. Издърпайте металния контейнер от пластмасовата част на инхалера и отстранете капачката на апликатора за уста.
2. Изплакнете пластмасовата част и капачката в топла вода.
3. Оставете ги да изсъхнат на сухо и топло място. Не ги нагрявайте.
4. Отново поставете на място металния контейнер и капачката.

Във водата може да разтворите слаб детергент или разтвор от типа на тези за измиване на бутилки за хранене на бебета (потърсете съвета на фармацевт). След това изплакнете обилно с чиста вода. Не поставяйте металния контейнер във вода.

8. Какво да направите в случай, че приемете повече от предписаното

Малко вероятно е случаиното приемане на твърде голяма доза от лекарството да ви създаде сериозни проблеми. Ако сте приели прекалено висока доза Budesonid forte или ако някой друг от обкръжението ви (особено деца) е поел от лекарството по невнимание, се консултирайте с лекуващия лекар.

9. Какво да направите в случай, че пропуснете прием

Ако сте забравили да приемете някоя доза, не се беспокойте. Приемете дозата веднага след като си спомните и продължете приемането на следващите дози точно според определеното време. Ако обаче е наблизило времето за следващия прием, изчакайте до неговото настъпване и приемете направо следващата доза. Не приемайте двойна доза!

10. Причинява ли Budesonid forte нежелани лекарствени реакции

След приемането му Budesonid forte, подобно на всяко друго лекарство, може да причини нежелани реакции.

- Може да се развие кандидоза на устата и гърлото. Лекува се с противогъбични продукти, без да се спира лечението с Budesonid forte.
- Рядко може да се появи дрезгавост на гласа или парене в устата. Затова се препоръчва изплакване на устата след инхалация.
- Продължителният прием на кортикоステроиди, включително budesonide, може да повлияе неблагоприятно върху надбъбречните жлези, както и да забави растежа при деца.



- В редки случаи може да се наблюдават глаукома, повищено вътречно налягане и катаракта.
- Нарушение в метаболизма на костите, водещо до остеопороза може да се появи при пациенти с фамилна обремененост за това, които приемат продължително високи дози от лекарството.
- **Изключително рядко може да усетите, че не ви достига въздух. В такъв случай СПРЕТЕ незабавно приема на лекарството и се обърнете към Бърза помощ или към лекуващия лекар.**

Информирайте лекаря, ако забележите други нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка или ако има нещо, което ви тревожи, смущава или не разбирате.

11. Как се съхранява лекарството

- Съхранявайте Budesonid forte, както и всяко друго лекарство на място, недостъпно за деца.
- Съхранявайте Budesonid forte на сухо място, при температура под 25°C. Да не се замразява.
- Както при повечето инхалаторни продукти в опаковки под налягане, лечебният ефект на лекарството може да намалее, когато металния контейнер е студен. Ако инхалерът се изстуди прекалено, извадете металния контейнер от пластмасовата част и го затоплете в ръцете си преди инхалиране. Не използвайте друго средство за затопляне.
- Не употребявайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.
- **Внимание!** Металният контейнер е под налягане. Да не се чупи, пробива или изгаря, даже ако е празен.

Запомнете! Това лекарство е единствено за вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите или подобни на вашите.

Може да ви се наложи да прочетете тази листовка отново. Не я изхвърляйте, докато приемате лекарството.

Дата на последна редакция: 2002 г.

