

Информация за пациента

Ambroxol AL 75 retard
Амброксол АЛ 75 ретард

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...08.10.02...

Скъпи пациенти,

Моля, прочетете внимателно настоящето указание за употреба, тъй като то съдържа важна информация относно това, какво трябва да съблюдавате при приложението на лекарствения продукт. Ако имате въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Ambroxol AL 75 retard
Амброксол АЛ 75 ретард

Лекарствено вещество: Ambroxol (под формата на Ambroxol hydrochloride)

Състав

1 капсула с удължено действие съдържа:

Лекарствено вещество: Ambroxol hydrochloride 75 mg

Помошни вещества: желатин, царевично нищесте, повидон, захароза, защитен лак, талк, оцветители E132, E 171, E 172 (Gelatin, Maize strach, Povidone, Sucrose, Shellack, Talcum, Indigotine - E132, Titanium dioxide - E 171, Ferrum oxide yellow - E 172)

Представяне и големина на опаковката:

Оригинална опаковка от 20 капсули с удължено действие

Оригинална опаковка от 50 капсули с удължено действие

Секретолитично при заболявания на дихателните пътища, придружени с гъсти секрети (експекторанс).

ALIUD^R PHARMA GmbH & Co.KG
Gottlieb-Daimler-Str. 19, D-89150 Laichingen, Germany
Internet: <http://www.aliud.de>; e-mail: info@aliud.de

Показания:

Муколитично лечение при остри и обострени хронични заболявания на бронхите и белия дроб, придружени с гъсти секрети.

Противопоказания:

Кога не трябва да приемате Ambroxol AL 75 retard?

Вие не трябва да използвате Ambroxol AL 75 retard при наличие на свръхчувствителност към действащото вещество амброксол хидрохлорид или към някоя от съставките на лекарството.

Кога може да приемате Ambroxol AL 75 retard само след консултация с Вашия лекар?

Ambroxol AL 75 retard трябва да се използва с особена предпазливост и повишено внимание при по-долу изброените условия. Обсъдете с лекуващия лекар, ако някои от тези условия са се появявали по-рано при Вас.

Ако Вие имате отклонения в бъбречната функция или тежки чернодробни заболявания, Ambroxol AL 75 retard може да се прилага само с особено внимание (напр. през удължени интервали или намалени дози).

Ambroxol AL 75 retard трябва да се прилага с внимание, под лекарски контрол при пациенти със смущения в механизма на отхрачването и аномална продукция на бронхиален секрет (напр. при рядко срещания малигнен цилиарен синдром) поради риск от конгестия на бронхиалната секреция.

Какво трябва да съблюдавате по време на бременност и кърмене?

По време на бременност, особено в първото тримесечие, и по време на кърмене, Ambroxol AL 75 retard трябва да се използва само след внимателна преценка полза/риск, т.к. до момента липсва достатъчен опит при тези случаи.

Какво трябва да се има предвид при деца?

Ambroxol AL 75 retard не е подходящ за деца под 12 години поради високото съдържание на действащото вещество. За деца под 12 години е подходящо да се прилага течната лекарствена форма, която е с намалено съдържание на действащо вещество.

Предпазни мерки при употреба и предупреждения:

Какво трябва да имате предвид при шофиране, при работа с машини или при работа без сигурна опора?

Няма специални изисквания, които да се имат предвид.

Лекарствени взаимодействия:

За кои други лекарствени продукти е известно, че повлияват върху ефекта на Ambroxol AL 75 retard ?

Едновременното приемане на Ambroxol AL 75 retard с други противокашлични (антитусивни) средства може да предизвика опасна конгестия на бронхиална секреция чрез инхибиране на откашличния рефлекс. По тази причина комбинираното лечение трябва да е особено внимателно.

За кои други лекарствени продукти е известно, че се повлияват от Ambroxol AL 75 retard ?

Едновременното използване на Ambroxol AL 75 retard с антибактериални лекарства (амоксицилин, цефуроксим, еритромицин, доксициклин) може да увеличи пенетрацията на тези антибиотици в белодробната тъкан.

Дозиране и приложение, продължителност на терапията

Тези инструкции важат само ако Вашият лекар не е предписал друго по отношение на лекарството Ambroxol AL 75 retard . Моля, спазвайте указанията за приложение за ефективно и безопасно лечение с Ambroxol AL 75 retard .

Какво количество капсули Ambroxol AL 75 retard трябва да приемате и колко често трябва да прилагате Ambroxol AL 75 retard ?

Възрастни и деца над 12 години

Обикновено дозата е една капсула с удължено действие Ambroxol AL 75 retard (еквивалентна на 75 mg Ambroxol hydrochloride) един път дневно, за предпочтение да се приема вечер.

Забележка:

Ако Вие имате отклонения в бъбреchnата функция или тежки чернодробни заболявания, Ambroxol AL 75 retard може да се прилага само през удължени интервали или намалени дози.

Как и кога трябва да прилагате Ambroxol AL 75 retard ?

Капсулите с удължено действие Ambroxol AL 75 retard се приемат след храна, без да се дъвчат, с достатъчно количество течност.

Забележка:

Секретолитичното действие на Ambroxol AL 75 retard се усилва от приема на течности.

Колко дълго можете да прилагате Ambroxol AL 75 retard ?

Продължителността на лечението се определя от вида и тежестта на заболяването, по прещенка на лекуващия лекар.

Ambroxol AL 75 retard не трябва да се прилага повече от 4-5 дни, освен ако лекуващият лекар не е предписал друго.

Предозиране и грешки при приложението

Какво трябва да направите в случай, че сте приложили твърде голямо количество от Ambroxol AL 75 retard (нарочно или случайно предозиране на продукта)?

Симптоми или признаки на отравяне не са наблюдавани при предозиране на Ambroxol. Съществуват съобщения за преминаващи безпокойство и диария.

В случай на екстремно предозиране може да се наблюдава повишено слюноотделение, гадене, повръщане и понижаване на кръвното налягане.

Свържете се с лекуващия лекар.

Спешни мерки като предизвикване на повръщане и стомашна промивка не са специално необходими и трябва да се предприемат само в случаи на екстремно предозиране. Лечението трябва да е в съответствие със степента и признаките на предозиране.

Какво трябва да направите в случай, че сте приложили твърде малко количество от Ambroxol AL 75 retard или сте пропуснали прием?

Ако сте пропуснали прием или сте приели по-малко от предписаната доза, продължете лечението с Ambroxol AL 75 retard , както е описано в инструкциите на дозиране.

Нежелани лекарствени реакции

Какви нежелани лекарствени реакции могат да се проявят при приложението на Ambroxol AL 75 retard ?

Съществуват редки съобщения за: стомашно-чревни симптоми (гадене, стомашна болка), реакции на свръхчувствителност (алергични реакции) по кожата и лигавиците (напр.

подуване, кожни обриви, зачервяване, сърбеж), задух, зачервяване на лицето, повишена температура с тръпки.

Прилагането на Амброксол в редки случаи може да се свърже с появата на сухота в устата и дихателните пътища, увеличена саливация(слюноотделение), увеличена секреция от носа, запек и затруднение в уринирането.

В единични случаи внезапните реакции на свръхчувствителност може да са свързани с тежки смущения в кръвната циркулация (анафилактичен шок). Ако това се случи, потърсете незабавно лекар.

В единични случаи се съобщава за алергични кожни възпаления (контактни дерматити).

Ако при Вас се срецират нежелани странични ефекти, които не са описани в настоящото указание за употреба, моля съобщете това на лекуващия лекар или фармацевт.

Какви мерки трябва да предприемете при нежелани лекарствени реакции ?

При първите симптоми на реакции на свръхчувствителност спрете приемането на Ambroxol AL 75 retard. Информирайте лекуващия лекар, който да прецени степента и необходимите мерки, които трябва да се предприемат.

Годност и стабилност на лекарствения продукт:

Датата на изтичане на срока на годност е отпечатана на блистера и на картонената опаковка.

Не използвайте продукта след тази дата!

Да се пази от светлина! Да се съхранява под 25° C!

Изготвяне на информацията

Октомври 1999

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Други форми и размери на опаковките

Ambroxol AL 30 Амброксол АЛ 30

Оригинална опаковка от 20 таблетки

Оригинална опаковка от 50 таблетки

Оригинална опаковка от 100 таблетки

Ambroxol AL Saft Амброксол АЛ сироп

Оригинална опаковка от 100 ml сироп

Оригинална опаковка от 250 ml сироп

Ambroxol AL Tropfen Амброксол АЛ капки

Оригинална опаковка от 50 ml капки перорални, разтвор

Оригинална опаковка от 100 ml капки перорални, разтвор

Рег. №