

Макет на надписите на първичната опаковка в реални размери:

ПАНАЦЕЯ 2001
50 ml
ANTIMYCO-ACID
АНТИМИКО-АЦИД

ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР(cutaneous solution)
Без лекарско предписание

Външно!

Продуктът съдържа: Активни вещества: Salicylic acid 4 g, Benzoic acid 4 g

Помощни вещества: ацетон, глицирин, етанол 96 на сто и пречистена вода до 50 ml.

Показания: Антимикотично и антисептично средство за външно приложение при дерматомикози и кандидози на гладката кожа и окосмената част на главата.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта, бременност и кърмене и деца под 6 годишна възраст

Специални предупреждения: Да не се приема вътрешно!

Да не се нанася на лигавици, открити рани големи

кожни участъци!

Запалим продукт!

Да се пазят очите!

Продуктът съдържа 20% етанол.

Продуктът не трябва да се прилага при бременност и кърмене.

Продуктът не трябва да се прилага под оклузивна превръзка!

Продуктът не бива да се прилага при пациенти с нарушено периферно кръвоснабдяване (захарен диабет).

Да не се прилага при болни с бъбречна недостатъчност.

По време на лечението с препарата да не се употребява алкохол!

Да не се прилага повече от 2-3 дни.

Възможна е проява на алергични реакции, дерматити, разранявания на кожата, а много рядко и прояви на „салицилово пияниство” (световъртеж, гадене, и повръщане, психомоторна възбуда, нарушения на дишането). При нежелани реакции лечението следва да се преустанови и се потърси лекарска помощ.

Начин на употреба: Само за дермално приложение, нанася се върху поразения участък от кожата с помощта на подходящ памучен тампон. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Продуктът не трябва да се прилага след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката.

Период на използване след първоначално отваряне 4 (четири) месеца.

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура до 25°C.

ПАНАЦЕЯ 2001, ул. Гъльбец, гр. София

Per. №

Парт. №

Годен до:

26.01.06
ИАЛ
одобрено!
дата № 11 (19.12.2005)

