

Информация за употреба

ASPERAN (АСПЕРАН)

Състав

Всяка таблетка съдържа:

Активна съставка:

Acetylsalicylic acid	325 mg
(Five Grains Each U.S.P.)	

Помошни вещества:

Carnauba Wax	1mg
Dibasic Calcium Phosphatum	15mg
Triacetinum	1mg
Hydroxypropyl Methylcellulose	3mg
Amylum maydis	35mg
Talcum	1mg

Свойства

Asperan притежава обезболяващо, температуропонижаващо и противовъзпалително действие. Тези ефекти на салицилатите се дължат главно на тяхното подтикващо действие върху синтезата на ендогенни вещества предизвикващи болка и възпаление. Asperan също така подтиква агрегацията на тромбоцитите.

Показания

За временно облекчаване на слаби и умерени болки свързани с простуда, главоболие или зъббол, мускулни болки, болки в кръста, слаби артритни болки; при трескави състояния; за вторична профилактика на болни с прекаран инфаркт на миокарда и такива със стенокардия или преходни мозъчно исхемични пристъпи.

Дозировка

Асперан се прилага през устата само при възрастни.

Противоболко~~ва~~, температуропонижаващо и противовъзпалително действие: обичайната дозировка е от 1 до 2 таблетки с вода три или четири пъти дневно според нуждите. При остри ревматични заболявания дозата достига до 4 грама дневно, разделени на няколко приема.

Противотромботично действие: при пациенти след прекаран инфаркт на миокарда, с преходна исхемична или нестабилна стенокардия, препоръчителната доза е 1 таблетка дневно.

При стари хора противоболко~~ва~~, температуропонижаващо и противовъзпалително действие: както при Възрастни.

Старите хора са по-податливи към някои странични ефекти, като стомашни оплаквания и шум в ушите.

Противотромботично действие при стари хора: не е добре установено отношението риск / полза.

Противопоказания

Бронхиална астма, свръхчувствителност към салицилати или други противовъзпалителни средства, хипопротромбинемия, хемофилия, тромбоцитопения, активна стомашна язва, дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа.

Преупреждения и препазни мерки

Asperan не трябва да се приема от деца и юноши под 12 годишна Възраст, специално за такива болни от Варицела, морбили или грип, без предварителна консултация с лекар за Възможност от развитие на синдрома на Reye (с начални симптоми - гадене, повръщане, треска), едно рядко, но сериозно заболяване свързано с приемането на салицилати.

Препаратът не трябва да се приема за повече от 10 дни или при трескащи състояния за повече от 3 дни, без лекарско предписание. Да не се взима от пациенти алергични към салицилати; внимателно да се приема от болни с анамнеза за стомашна язва, нарушения в кръвосъсирването или астма. Във високи дози салицилатите могат да намалят нуждите от инсулин. Пациентите с високо кръвно налягане трябва да бъдат под наблюдение. При продължително приемане могат да се появят симптоми на шум в ушите.

Употреба при бременни и кърмачки

Asperan трябва да се приема с внимание от бременни жени, особено в последните три месеца от бременността. Салицилатите се отделят с майчиното мляко, затова Asperan не трябва да се приема от кърмачки.

Страницни реакции

Салицилатите могат да предизвикат реакции на свръхчувствителност у чувствителни пациенти (бронхоспазъм, астма, алергични дерматити), уратни бъбречни камъни, язви в гастроинтестиналния тракт, вторична (следствие на кървене от гастроинтестиналния тракт) или хемолитична (при пациенти с глюкозо-6-фосфатен дифицит) анемия, шум в ушите, гадене и повръщане.

Лекарствени взаимодействия

Не се препоръчва едновременното приемане на големи дози салицилати с нестероидни противовъзпалителни средства, антикоагуланти и антидиабетични средства, поради засилване на техните ефекти.

Срок на годност

3 години

Условия на съхранение

Да се съхранява на сухо и тъмно място, при стайна температура. Да се пази от деца. В случаи на случайно предозиране да се потърси лекарска помощ или незабавен контакт с център за отравяния.

Опаковка

по 100 таблетки от 325 mg в пластмасова банка с алюминиева бленда и пластмасова капачка.

Име и адрес на производителя

PERRIGO COMPANY,

117 Water str., Allegan, Michigan,

U.S.A. 49010