

05.03.02

Листовка за пациента

ASPIRIN®

(АСПИРИН®/ ACETHYLSALICYLIC ACID)

СЪСТАВ

Acetylsalicylic acid - 500 mg в една таблетка

ДЕЙСТВИЕ

Аспирин® притежава противоболков, противо-възпалителен и намаляващ високата температура ефект, а според прилаганата доза проявява и противоревматичен ефект. В ниски дози (от 50 до 150 mg) може да се използва като средство предотвратяващо образуването на кръвни съсиреци, предизвикващи запушването на кръвоносните съдове. Многоцентрови добре контролирани клинични проучвания доказват, че в тези малки дози Аспирин® предотвратява риска от внезапна сърдечна смърт и/или нефатални миокардни инфаркти при пациенти с прекаран миокарден инфаркт или нестабилна ангина пекторис (гръдна жаба), намалява риска от преходни нарушения на мозъчното кръвообъщение и мозъчни инсулти.

ПОКАЗАНИЯ

За премахване на болката и/или високата температура при остри и хронични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища; грип и други вирусни заболявания; остри инфекциозни болести; за облекчение на симптомите като болка, оток, зачеряване и локално повишение на температурата при възпалителни и дегенеративни ставни заболявания; хронични инфекциозни заболявания; температурни състояния от неясен произход.

Профилактика на тромбоемболични инцидени (образуване на кръвни съсиреци) при пациенти с анамнеза за прекаран миокарден инфаркт или нестабилна ангина пекторис (гръдна жаба), при пациенти с анамнеза за преходни нарушения на мозъчното кръвообъщение и при пациенти след кардиоваскуларни хирургични интервенции;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аспирин® е противопоказан: при алергия; при кървящи язви или други остри заболявания на стомашно-чревния тракт; при проблеми с кръвосъсирването като хемофилия, тромбоцитопения, хеморагични състояни и др.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ЕФЕКТИ

При продължителна употреба на по-високи дози (над 3-4 таблетки дневно) могат да се наблюдават нежелани странични ефекти като дразнене, болки или киселини в стомаха; неразположение или подуване на червата, повишено отделяне на газове; при по-продължителна употреба на високи дози могат да предизвикат скрити кръвоизливи в стомаха и червата, нарушения в кръвосъсирването, световъртеж, главоболие, шум в ушите, учестено дишане (т.н. салицилово пиянство), съниливост, известна задръжка на течности в организма; алергични реакции се наблюдават независимо от приетата доза и могат да се изразят в различни кожни обриви и др.

ПРЕДОЗИРАНЕ

При предозиране на Аспирин® може да се наблюдава силно дразнене на стомаха и червата, гадене, повръщане, нарушения в съсирането на кръвта и др.

При тежка интоксикация след неволно приемане на много високи дози Аспирин® се наблюдава главоболие гадене, повръщане и диария, превъзбуда и обърканост, халюцинации, необясним фебрилитет, зрителни смущения, смущения в слуха (шум или „пищене“ в ушите), учестено и повърхностно дишане, кървава урина, гърчове, и др.

Лечение - след изпразване на стомаха чрез прадизвикване на повръщане и прием на медицински въглен и др. е наложителна бързо лекарска помощ и постъпване в болнично заведение.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Някои медицински проблеми могат да се влошат от прием на ацетизал, поради което се консултирайте с вашия лекар ако имате гастрит, стомашна язва, язва на дванадесетопръстника или други стомашно-чревни проблеми, като колит, възпаление на жълчката и др., астма, алергии, полипи в носа (в момента или в миналото), високо кръвно налягане, бъбречни или чернодробни болести, анемия, хемофилия или други проблеми на съсирането на кръвта, обилна менструация или маточни кръвоизливи с

различен произход, подагра (Аспирин® може да повиши серумното ниво на пикочната киселина и така да провокира пристъп на заболяването);

Не употребявайте таблетки Аспирин®, които имат неприятна кисела миризма (подобна на миризма от оцет);

Аспирин® не трябва да се прилага дълго време (над 10 дни) и/или във високи дози (повече от 8 таблетки за 24 часа, а за възрастни над 60 години повече от четири таблетки за 24 часа) без лекарско предписание;

При по-продължително прилагане (над 10 дни) да се контролира кръвното налягане, особено при хипертоници;

Не се препоръчва употребата на Аспирин® при деца под три годишна възраст;

При деца от 3 до 12 години да се дава Аспирин само по лекарско предписание, особено ако имат висока температура грип или други вирусни инфекции, особено шарки, тъй като могат да появят редки, но тежки странични ефекти (синдром на Рей).

Възрастните хора са по-чувствителни към салицилатите и при тях могат да се наблюдават по-често странични ефекти, поради което трябва да се прилагат в редуцирани дози;

Препоръчва се спиране на терапията с Аспирин® поне 5 дена преди провеждане на хирургическа интервенция за предотвратяване на кръвотечения;

При лечение на артити дозата не трябва да се променя по-често от един път седмично по лекарско предписание за да се получи желания терапевтичен ефект без риск от нежелани ефекти.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

При едновременно приемане на Аспирин® и някои други медикаменти могат да се получат неблагоприятни взаимодействия, затова е желателно да предупредите лекуващия си лекар ако приемате някои от следните лекарствени средства: антикоагуланти (лекарства против повищено съсирване на кръвта); някои антибиотици като карбеницилин, цефамандол, ципрофлоксацин, тетрациклин; други противоболкови и противовъзпалителни лекарствени средства; кетоконазол (противогъбичен препарат); пентоксифилин и др.

Ако приемате повече медикаменти посъветвайте се с лекуващ лекар дали е подходящо комбинирането им с Аспирин®.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНИЕ

Не се препоръчва употребата на препарата от бременни жени, както и от жени в кърмачески период. Особено важно е да не се прилага в последните три месеца от бременността поради опасност от увреждане на плода или компликации по време на раждането;

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не са установени противопоказания

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Аспирин® се приема перорално след разтваряне в една кафена или чаена чаша вода; При възрастни - като противоболково и противотемпературно средство се приема 1 до 4 таблетки от 500 mg с минимален интервал между приемите от 4 до 6 часа (максимална дневна доза 3 g) за кратък срок от време (от 1 до 3-4 дни);

При ревматични заболявания - 1-2 таблетки по 500 mg 3 до 4 пъти дневно за продължителен период под лекарско наблюдение;

За профилактика на тромботичните състояния по 250 mg (1/2 таблетка) еднократно дневно, по-време или след нахранване; желателно е таблетката да се разтвори предварително в малко количество вода за да се избегне дразнещото й действие върху стомаха.

При деца над 12 години според лекарско предписание: обично по 1/2 до 1 таблетка при нужда, но не повече от два до три пъти дневно (не се употребява по-продължително от 2 до 3 дни); при ревматични заболявания дозата може да се повиши от лекуващия лекар и срока за приемане да се удължи.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Таблетки 500 mg по 20 броя в опаковка

СЪХРАНЕНИЕ:

В оригинални опаковки на сухо и защитено от светлина място при температура не по-висока от 25°C.

СРОК НА ГОДНОСТ

4 /четири/ години

ПРОИЗВОДИТЕЛ

"ФАРМАЦИЯ-АД" гр Дупница ул. "Самоковско шосе" 3,
в сътрудничество с Bayer Leverkusen.

тел. (701) 2-42-81/82, 2-90-21/29

Факс: (701) 2-23-65, 2-81-62

Телекс: 27433

Листовката е съставена на

Информацията в листовката е одобрена на