

Макет на опаковката

Етикет

“Химакс Фарма” ЕООД - 1618 София, ул. „Горица” 8А Antimyco-beta		50 ml e
ВЪНШНО!	Антимико-бета	
Дермален разтвор (Sol. Cut.)		
		
Партиден №:	Годен до:	Рег. №
Без лекарско предписание		
Състав: Препаратът съдържа лекарствени вещества salicylic acid (5 %) и 2-naphtol (1 %) и помощни вещества етанол, глицерин, ацетон и пречистена вода.		
Показания: Съпътстваща терапия при лечение на дерматомикози на гладката кожа и окосмената област на главата; интердигитална и ингвинална епидермофития.		
Приложение: Прилага се външно, като засегнатото място се намазва един- два пъти дневно. Да се употребява средно 10 дни (7-14 дни).		
Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките. Да не се употребява при деца до 6 години, бременност и кърмене!		
Специални предупреждения: Да не се прилага върху големи участъци на кожата, лигавици, открити рани и под оклузивна превръзка! Да се пазят очите! Да не се прилага при болни с бъбречна недостатъчност! Да се прилага с особено внимание при: деца, пациенти с нарушения в периферното кръвообращение или с Diabetis melitus!		
Продуктът съдържа етанол (32 % обем/ обем).		
Продуктът е запалим!		
Лекарствени взаимодействия: Да не се прилага съвместно с етерични масла, амонячни разтвори и живачни съединения. Терапевтичният ефект се намалява при използване на алкални сапуни и шампоани.		
Нежелани лекарствени реакции: Възможна е появата на алергични реакции, дерматити, разязяване на кожата, а много рядко – прояви на интоксикация (световъртеж, гадене, повръщане, психомоторна възбуда, нарушения в дишането). При поява на нежелани лекарствени реакции, лечението да се преустанови и да се потърси лекарска помощ!		
Условия на съхранение: Да се съхранява добре затворен, на тъмно и сухо място при температура под 25°C! Да се пази от деца!		
Срок на годност след отваряне на опаковката: Четири месеца.		



23. 08. 2005 г.

24. 09. 05



Вторична опаковка

Не се предвижда.