



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

NORVASC®
НОРВАСК®
(Amlodipine)

Моля, прочетете тази листовка!

Тази листовка е за лекарството НОРВАСК. Моля, прочетете я преди да започнете приемането на НОРВАСК. Тази информация ще Ви бъде полезна. Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от допълнителна информация, потърсете Вашия лекуващ лекар или фармацевт. Можете да пожелаете да прочетете отново тази информация, затова пазете тази листовка.

Името на това лекарство е НОРВАСК. Лекарственото вещество е amlodipine (амлодипин).

Какво съдържа НОРВАСК

Таблетките НОРВАСК имат различна концентрация на лекарственото вещество, съответно 5 мг и 10 мг.

Таблетките от 5 мг са бели с форма на смарагд, маркирани "AML-5" от едната страна и "Pfizer" от другата..

Таблетките от 10 мг са бели с форма на смарагд, маркирани "AML-10" от едната страна и "Pfizer" от другата..

Помощни вещества: безводен калциев хидроген фосфат, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза и натриев нишестен гликолат (тип A).

НОРВАСК се предлага в опаковки от 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

PFIZER EUROPE MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ

Производител

Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co KG, Heinrich-Mack-Strasse, 89257 Illertissen,
Germany

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НОРВАСК И ЗА КАКВО СЕ УПОТРЕБЯВА

Какъв тип лекарство е НОРВАСК

Норваск принадлежи към група лекарства, наречени калциеви антагонисти.

За какво се използва НОРВАСК

НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост с други лекарства за понижаване на кръвното налягане. Прилага се и при лечение на стенокардия (различни форми на ишемична болест на сърцето, при която се нарушава кръвоснабдяването на сърцето, в резултат на което възниква болка в гърдите).



При пациенти с високо кръвно налягане HOPBACK действа, като разширява кръвоносните съдове така, че кръвта преминава през тях по-лесно. При пациенти със стенокардия HOPBACK действа, като подобрява кръвоснабдяването на сърденния мускул, който така получава повече кислород и като резултат се предотвратява гръдената болка. HOPBACK не осигурява бързо облекчение на гръдената болка при стенокардия.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ HOPBACK

HOPBACK не трябва да се използва, ако имате:

- Алергия към HOPBACK или други калциеви антагонисти, наречени дихидропиридини. Това може да се изразява в болка, зачеряване на кожата или затруднения в дишането.
- Алергия към някое от помощните вещества на лекарството.

Ако отговорът на някои от въпросите по-долу е ДА, уведомете Вашия лекар преди да приемете HOPBACK:

- Прекарали ли сте скоро сърдечен удар или имате хипертонична криза?
- Имате ли чернодробно заболяване?
- Бременна ли сте? Кърмите ли? Ако сте жена в детеродна възраст, препоръчителна е ефективна контрацепция.
- Под 18 години ли сте?

Вашият лекар може би все още желае да приемате таблетките.

Клиничният опит показва, че е малко вероятно HOPBACK да наруши способността Ви за шофиране и работа с машини.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ HOPBACK

Обичайната доза HOPBACK за стенокардия и високо кръвно налягане е една таблетка от 5 mg дневно. По преценка на Вашия лекар дозата може да бъде увеличена до две таблетки от 5 mg дневно или една таблетка от 10 mg дневно.

Приемайте таблетките, както е посочено от Вашия лекар. Най-добре е да приемате таблетките по едно и също време всеки ден с чаша вода. Продължавайте да приемате таблетките всеки ден. Те могат да Ви помогнат да се чувствате по-добре. Не чакайте таблетките да се свършат, за да посетите Вашия лекар. Вашият лекар може да пожелае да Ви предпише още таблетки HOPBACK.

Ако все още не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Какво ще се случи, ако приемете твърде много таблетки

Ако приемете твърде много таблетки, може да се почувствате зле. Ако няколко таблетки бъдат приети наведнъж, това може да е опасно. Уведомете незабавно Вашия лекар или идете до най-близкото спешно отделение.

Какво ще стане, ако пропуснете таблетка

Не се тревожете. Ако забравите да вземете една таблетка, оставете напълно тази доза. Вземете следващата си доза по същото време.

ПРИЧИНЯВА ЛИ HOPBACK НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ



HOPBACK, както всички лекарства, може да причини някои нежелани лекарствени реакции. Най-чести са: зачервяване, уморяемост, оток (например оток на глезените), замаяност, главоболие, коремни болки, гадене, сърцебиене (по-бързо и неравномерно биене на сърцето), съниливост.

Уведомете Вашия лекар, ако тези ефекти Ви причиняват проблеми или продължават повече от една седмица.

Следните състояния са наблюдавани при пациенти, приемали HOPBACK, но могат да са резултат от лекуваното заболяване: сърдечен удар (миокарден инфаркт), неравномерно биене на сърцето (аритмия) и гръден болка.

Всички лекарства могат да причинят алергични реакции. Следните случаи се наблюдават рядко при пациенти, които се лекуват с HOPBACK: сърбеж по кожата, обрив, оток на ларинкса и състояние, наречено еритема мултиформе (зачервени петна върху кожата). Тежки алергични реакции са изключително редки и понякога животозастрашаващи. Всяко внезапна поява на хъркане, затруднение в дишането, подуване на клепачите, лицето или устните, обрив или сърбеж (особено по цялото тяло) трябва да бъде незабавно съобщена на Вашия лекар.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някаква друга нежелана реакция.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Съхранявайте Вашето лекарство при температура под 30°C.

Пазете всички лекарства на недостъпно за деца място!

Грижете се за Вашето лекарство! Това лекарство е предназначено лично за ВАС. НЕ ТРЯБВА да го давате на други. То може да не е подходящо за тях, дори и ако симптомите на заболяването им са сходни с Вашите.

Не приемайте лекарството след датата на изтичане срока на годност, обозначенa върху опаковката.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в тази листовка е само за HOPBACK. Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на листовката:

