

Информация за пациента

BRONCHOLIROL P

Бронхолирол П

прах за сироп против кашлица

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВОНАРОДНИТЕ

Приложение към
разрешение за употреба №

N-2/25.03.02

Ефим

СЪСТАВ

Лекарствени вещества: Glaucine hydrobromide 17,2 mg, Pseudoephedrine hydrochloride 13,8 mg в едно саше, съдържащо 6,5 g прах за сироп.

Помощни вещества: захароза, метил паракидроксибензоат, пропил паракидроксибензоат, босилково масло, лимонена киселина монохидрат, полисорбат 80.

ПОКАЗАНИЯ

Лечение на кашлица при остър и хроничен бронхит, трахеобронхит, астматичен бронхит, бронхиална астма и коклюш.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към някоя от съставките; високо кръвно налягане, тежки органични заболявания на сърцето с явления на декомпенсация, стенокардия, атеросклероза; безсъние; тиреотоксикоза; феохромоцитом; тесноъгълна глаукома; адено на простатата със задръжка на урина; лечение с МАО-инхибитори.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Разтворът се приготвя непосредствено преди употреба! Да се разбърква добре!

Внимание

Важно за диабетици! Едно саше съдържа 6,24 g захароза (26 ккал). Неподходящ е при хора с вродена непоносимост към фруктозата, синдром на малабсорбция към захари или захарозно-изомалтозна недостатъчност. Поради наличието на паракидроксибензоати в състава са възможни реакции на свръхчувствителност (уртикария, дерматит, бронхоспазъм).

Лекарствени и други взаимодействия

При пациенти с астма да се комбинира внимателно с бронходилататори

поради рисък от усилване на някои нежелани лекарствени реакции.

При едновременно приложение с гванетидин се антагонизира действието на гванетидина. МАО-инхибиторите и бета-адренергичните блокери могат да усилят ефекта на псевдофедрина.

Употреба при бременност и кърмене

Да не се прилага през първите 3 месеца на бременността и в периода на кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не повлиява остротата на вниманието и реакциите.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Съдържанието на едно саше се разтваря в 1/2 - 1 чаша вода и се приема еднократно. Ако лекарят не е предписал друго, дозата при възрастни и деца над 10 години е по 1 саше 3-4 пъти дневно.

ПРЕДОЗИРАНЕ

При предозиране може да се появят гадене, повръщане, загуба на апетита, нервна възбуда, лек трепер (треперене) на крайниците, световъртеж, затруднено уриниране. В такива случаи трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекуващ лекар.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Рядко може да се наблюдават бързопреходни лек трепер и сърцевиене, които се появяват 15-30 минути след приема на продукта. При хипертрофия на простатата е възможна задръжка на урина. При сърдечно-съдови заболявания - ритъмни и проводни нарушения, артериална хипертония.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо място, при температура под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Да не се употребява след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката!

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Без лекарско предписание!

Последна редакция на информацията: 01.2002 г.