


ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ... 18.07.06г.

1101-2
Bulgaria



**КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ТАБЛЕТКИТЕ
MST CONTINUS 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg
Morphine Sulphate**

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете листовката за пациента внимателно, тъй като тя съдържа важна информация, която трябва да имате предвид при използването на лекарствения продукт. Ако имате въпроси, моля свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Информация за пациенти

Какво представляват таблетките MST CONTINUS

Таблетките са с филмово покритие и модифицирано освобождаване и съдържат активната съставка Morphine sulphate BP (10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг).

Морфинът принадлежи към групата лекарствени средства, наречени аналгетици или „болкоуспокояващи“.

Таблетки с изменено освобождаване на активната субстанция, с филмово покритие, двойно изпъкнали, обозначени със знак NAPR от едната страна и съдържанието на активното вещество от другата страна.

Таблетките MST CONTINUS от 10 мг са златисто-кафяви

Таблетките MST CONTINUS от 30 мг са тъмно-лилави

Таблетките MST CONTINUS от 60 мг са оранжеви

Таблетките MST CONTINUS от 100 мг са сиви

Таблетките MST CONTINUS съдържат също следните неактивни съставки:

* Лактоза (с изключение на тези от 100 мг)

* Хидроемулулоза

* Кетостеарил алкохол

* Магнезиев стеарат

* Талк

Всички таблетки MST CONTINUS имат покритие от:

* Хипромелоза

* Макрозол

* Титаниев дьоксид (E171)

Оцветителите на таблетките са както следва:

10 мг – Железен окис (E172)

30 мг – Еритрозин (E127), индигоцв. червено (E132), жълто (E110)

60 мг – Еритрозин (E127), хининово жълто (E104), жълто (E110)

100 мг – Железен окис (E172), индигоцв. червено (E132)

* Внимание: Жълтият оцветител (E110) може да предизвика алергични реакции като астматичен пристъп.

Това се среща особено често при хора, алергични на аспирин.

Всяка купия съдържа 60 таблетки

За какво са предназначени таблетките?

За облекчаване на силна болка

Кой може да взема таблетките?

Възрастни и деца над 1 година

Таблетките MST CONTINUS с по-слабо действие могат да бъдат предписвани и на възрастни за облекчаване на слепонеративна болка.

Преди да вземете таблетките, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако:

- сте бременно или кърмите
- приемате лекарства за лечение на депресия, например МАО-инхибитори
- сте приемали такива лекарства през последните две седмици
- Вземате лекарства за сън, например транквилайзатори, хипнотични или седативни средства, или ако ще започвате да ги вземате, докато все още приемате MST CONTINUS
- сте чувствителни или алергични спрямо морфин
- приемате лекарства за високо кръвно налягане
- насърко са Ви поставили анестетик за отпускане на мускулите
- приемате симетицин (стомашно-бръвни смущения)

Съобщете на Вашия лекар или фармацевт, ако имате едно от посочените по-долу оплаквания:

- Астма
- Хроничен бронхит
- Проблеми с бъбреците
- Чернодробни заболявания



- Чревна непроходимост (вие заболяване на червата)
- Каквите и да било проблеми с храносмилането (като забавено освобождаване на червата или остръ корем)
- Повишено вътречеречно налягане (остро гълобоболие, гадене)
- Ниско кръвно налягане
- Панкреатит (възпаление на панкреаса)
- Адренокортикална недостатъчност (нарушена функция на задстомашната жлеза)
- Хипертрофия на простата (доброкачествено увеличение на простатата)

Ako Ви предстои операция, убедете лекаря в болницата, че приемате тези таблетки.

Вземайте таблетките само ако те са предписани на Вас. Никога не ги давайте на други хора, дори и да имат оплаквания, подобни на Вашите.
Не пийте алкохол по време на лечението с таблетките и не карайте кола или не работете с машини, ако чувствате сънливост и не можете да се концентрирате.

Как да приемате таблетките!

На опаковката на лекарството е указано по колко таблетки трябва да вземате и колко често. Ако имате съмнения, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт. Не приемайте повече таблетки от указаните на опаковката!

Гълтайте таблетките цели с вода. Не ги напрошавайте и не ги разчупвайте!

Трябва да вземате таблетките на всеки 12 часа. Например, ако вземате таблетка в 8 часа сутринта, следваща таблетка трябва да вземате в 8 часа вечерта.

Какво трябва да направите ако сте забравили да вземате таблетките си?

Ако си спомнете, че сте пропуснали да вземате таблетката си преди да са изминали 4 часа от времето за приемането ѝ, вземате я веднага. Следващата таблетка трябва да приемате в определеното за нея време.

Ако сте закъснели с приема на таблетката повече от 4 часа, обърнете се към Вашия лекар за съвет. Той може да Ви даде друго болкоуспокояващо до времето за следващата таблетка.

Какво трябва да направите ако някой случайно гълтне всички таблетки или Вие приемате много наведнъж?

Веднага се обадете на Вашия лекар или в болницата.

Ще имате ли някакви проблеми при приемането на таблетките?

При повечето хора приемането на тези таблетки причинява запек. Вашият лекар може да Ви предпише леко слабително средство. Освен запека, при повечето хора приемането на тези таблетки не създава други проблеми.

При приемането на таблетките може да почувстввате гадене (или повръщане). Това ще премине след няколко дни. Вашият лекар може да Ви предпише препарат против повръщане.

Когато започнете приемането на таблетките или когато увеличавате дозата, може да почувстввате че не можете да се концентрирате или че Ви се спи повече от обичайното. Тези оплаквания ще преминат след няколко дни.

При някои хора могат да се появят следните оплаквания: сухота в устата, изпотяване, световъртеж (замайване), гълобоболие, промени в настроението, нарушен сърден ритъм, дизориентация (объркане), зачервяване на лицето, халюцинации, бронхоспазъм (стесняване на дихателните простица) и колики (внезапна коремна болка). Много рядко може да се наблюдава затруднение в уринирането. Съобщени са редки случаи на понижено кръвно налягане и забавен сърден ритъм. Някои пациенти имат оплаквания от алергични реакции като обрив и сърбеж.

Ако имате някое от тези оплаквания, убедете Вашия лекар.

Колко дълго можете да съхранявате таблетките и как?

Върху опаковката на таблетките има обозначение „годност до“. Например EXP 8.99 означава, че след края на август 1999 не трябва да вземате таблетките.

Съхранявайте таблетките при температура под 25 °C. Пазете ги на място извън достъпа на деца!

Дата на изготвяне на листовката
28 януари 2004

Производител:
Bard Pharmaceutical Ltd.
Cambridge Science Park-Milton road –
Cambridge CB4 0GW – UK

Примеждател на разрешението за употреба:
Mundipharma Medical Company
Mundipharma House, 14 Par-La-Ville
Hamilton HM1X, Bermuda

