

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

В и с о р а п[®] супозитории
(Бускопан)
(hyoscin-N-butylbromid)

Състав:

1 супозитория съдържа 10.0 mg
hyoscin-N-butylbromid

Свойства:

Buscopan премахва спазмите на гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт, жълчните и пикочно-полови пътища. Действащата субстанция не прониква в ЦНС и не се получават странични явления от ЦНС.

Показания:

Гастроинтестинални спазми и функционални смущения на жълчната система, спазми в пикочо-половия тракт.

Противопоказания:

Buscopan не се преписва при тежки заболявания на нервната система /миастения гравис/ и някои заболявания на дебелите черва /мегаколон/. Също не трябва да бъде прилаган при болни с регистрирана чувствителност към активната съставка на препарата.

Странични действия:

Могат да се наблюдават сухота на устната лигавица, участена сърдечна дейност и задръжка на урината, но те са слабо проявени и ограничени.

Алергични реакции, включително кожни обриви се наблюдават много рядко. При болни с анамнеза на бронхиална астма или алергия са съобщени единични случаи на затруднено дишане.

Взаимодействия:

С Buscopan може да бъде засилено действието на редица препарати за лечението на нервни заболявания, диабет, алергия и пр. (трициклични антидепресанти, антихистамини, гвинидини, амантидин и дисопирамиди). Когато се прилагат две лекарствени средства за лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт може да се наблюдава намаляване на тяхното действие /бускопан и метоклопамид/. С Buscopan може да бъде засилен ефекта върху сърдечната дейност, който имат някои лекарствени средства /β-адренергичните препарати/.

Предпазни мерки при употреба:

Поради потенциален риск от антихолинергични усложнения е необходимо внимателно приложение на препарата при болни с глаукома, при склонност към запушване на червата и пикочните пътища и при болни с ученестна и неправилна сърдечна дейност. Buscopan не оказва влияние върху възможностите за работа с машини и шофиране.

Бременност и кърмене:

По време на бременност продължителни изследвания не са установили увреждащ ефект. Независимо от това препаратът трябва да се прилага внимателно по време на бременност, особено през първите три месеца.

При приложение по време на кърмене не е доказана безвредност.

Дозировка и приложение:

Ако няма друго лекарско предписание се препоръчват следните дозиравки:

Ректално

Супозитории:

Възрастни и деца над 6 год.: 3-5 пъти дневно 1-2 супозитории
След отстраняване на обвивката супозиториите трябва да бъдат въведени в ректума /правото черво/.

Съхранение:

Да се съхранява на сигурно място, недостъпно за деца.

Срок на годност:

Срокът на годност на Buscopan супозитории е 5 год. от датата на производството.

Buscopan супозитории не трябва да бъдат използвани след датата, посочена върху опаковката.

Производител:

Бюргингер Ингелхайм Интернационал ГмбХ

Бингер Шрасе 173

D-55216 Ингелхайм ам Рейн

Германия

Опаковки:

супозитории

Последна ревизия:

17 ноември 1995 год.

