

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...27.06.03...

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да използвате това лекарство!

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате допълнително въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано за Вас лично, не трябва да го предлагате на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите като Вашите.

В тази листовка :

1. Какво е BIVACYN и за какво се използува
2. Преди да използвате BIVACYN
3. Как се използува BIVACYN
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на BIVACYN

BIVACYN® Cutaneous spray, powder

БИВАЦИН® дермален спрей, прах

NEOMYCIN / BACITRACIN

Активни вещества : антибиотиците neomycin и bacitracin

Помощни вещества : колоидален силициев диоксид, NORPAR 5S, DRIVOSOL 27.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба :

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

1. КАКВО Е BIVACYN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗУВА

Bivacyn е комбинация от двата антибиотика neomycin и bacitracin за лечение и профилактика от инфекции. Той убива бактериите, които причиняват инфекцията.

Използва се като дермален (кожен) спрей само за външна употреба.

BIVACYN® spray се продава като :

БИВАЦИН® дермален спрей, прах.



Всеки 150 ml от дермалния спрей, прах съдържат 165 000 IU neomycin под формата на neomycin sulphate и 12 500 IU bacitracin

Опаковка :

Кутии със спрей опаковки по 150 ml спрей.

За какво се използва BIVACYN® spray?

Той се използва за външно (локално прилагане върху кожата) лечение на всяка от следните инфекции :

- Епидермална пиодермия (от групата на импетиго) – гнойна инфекция на кожата
- Епидермокутанна пиодермия (фоликулит) – основно предотвратява разпространението на гнойната инфекция върху кожата около космените фоликули.
- Инфекции, причинени от повърхностни рани, изгаряния или разяззвания
- Профилактика на гнойни суперинфекции в случаи на повишен риск от техните причинители (херпес симплекс, херпес зoster инфекции или ужилвания от насекоми)
- Профилактика на инфекции след хирургическа намеса

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗУВАТЕ BIVACYN

Да не се прилага, ако :

Сте свръхчувствителни към neomycin и други аминогликозидни антибиотици, bacitracin или други съставки на този лекарствен продукт.

Специални предпазни мерки при употреба

Лекарственият продукт не трябва да се прилага върху големи повърхности (> 20%) от увредената кожа (отворени рани, изгаряния или разяззвания), тъй като могат да се появят вследствие на системната абсорбция и токсични ефекти от двата антибиотика.

Кажете на Вашия лекар, ако имате някакви хронични заболявания, нарушения в обмяната на веществата, ако сте свръхчувствителен към някакво лекарство, както и за всички други лекарства, които взимате. Изиска се предпазливост при увредена бъбречна функция, тъй като съществува потенциална опасност лекарственият продукт да увреди бъбреца.



Ако имате остра или упорита инфекция, Вие се нуждаете от хирургически процедури и допълнително системно лечение с антибиотици.

Трябва да прекратите употребата на Bivacyn, ако се появят признаки на възпаление или реакции на свръхчувствителност (кожни обриви, отоци по лицето, врата и тялото или затруднения в дишането, докато прилагате лекарствения продукт). Употребата на лекарството трябва да се избягва при болни, които са предразположени към алергии.

Локалното приложение е свързано с растеж и развитие на бактерии и гъбички, особено дрожди.

Не бива да употребявате никой от Bivacyn лекарствените продукти повече от една седмица, освен ако Вашият лекар не прецени друго.

Bivacyn не трябва да се употребява при пеленачета под пелените, тъй като пелената действува като покриваща превръзка, което значително може да повиши абсорбцията на двата антибиотика.

Специални предупреждения за употреба

Опаковката е под налягане. Тя съдържа озонов пропелант. Да се пази от източник на топлина и слънце. Да не се пробива или нагрява, дори когато е празна. Да не се пръска в съседство с открит пламък.

Огнеопасно !

Избягвайте контакт с очите

Бременност и кърмене

Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или смятате, че сте. Bivacyn трябва да се прилага само, когато е ясно показан, и то върху малки участъци за кратки периоди, поради риск от възможна системна абсорбция, свързана с локалното приложение.

Шофиране и работа с машини

Няма информация относно ефектите на лекарството върху шофирането и работа с машини.

Приемане на други лекарства

Кажете на Вашия лекар, ако взимате някое лекарство по или без лекарско предписание.

Ако едновременно използвате ототоксични и нефротоксични лекарствени продукти (лекарства с увреждащо въздействие върху



бъбречите или слуха) като стрептомицин, канамицин, полимиксин В, Вие трябва да сте предпазливи, поради опасност от натрупване на токсични ефекти.

Едновременното локално приложение с други лекарства не се препоръчва.

Ако имате миастения гравис или ако приемате нервномускулни блокиращи агенти, Вие не трябва да употребявате Bivacyn върху широки участъци от възпалената кожа.

Тъй като Bivacyn има нервномускулно блокиращ ефект, болните, които конкретно получават лекарства с подобно действие, трябва да се наблюдават за признания на възможен респираторен дистрес (дихателна недостатъчност).

3. КАК СЕ ИЗПОЛЗУВА BIVACYN

Този лекарствен продукт е само за локално приложение върху кожата. Вие трябва да разплатите добре опаковката преди всяка употреба. Спрят се пръска така, че да покрие възпаления кожен участък от разстояние 20-25 см един път до максимум три пъти дневно. След употреба обърнете флакона и почистете вентила чрез кратко натискане.

Ако приложите повече BIVACYN, тогава тряба

Консултирайте се с Вашия лекар, ако случайно приложите големи дози. Системните токсични ефекти (ототоксичност – вариращи степени на загуба на слуха, нефротоксичност – намалена бъбречна функция) са необичайни и могат да се появят само след продължителна употреба на големи дози върху обширни участъци от възпалената кожа.

Ако сте забравили да приложите BIVACYN

Ако сте пропуснали доза, приложете следващата, колкото може по-скоро и продължете, както преди.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Като всеки лекарствен продукт при употребата на Bivacyn могат да се появят нежелани лекарствени реакции, които обикновено са леки и бързопреходни.

Ако наблюдавате някой от следните, информирайте Вашия лекар незабавно :

- Реакции на свръхчувствителност към активните съставки на лекарството, локално кожно дразнене, обрив, оток



уртикария, допълнителни инфекции (суперинфекции върху възпалената кожа).

Макар и рядко е възможна појава на системни нежелани лекарствени реакции, свързани с локалния начин на употреба.

Вие трябва да съобщите на Вашия доктор, ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, които са свързани с употребата на това лекарство.

5. СЪХРАНЕНИЕ

Да се пази на места, недостъпни за деца !

Да се съхранява при температура под 25° С.

Да се пази от огън !

Срок на годност : отпечатан на всяка опаковка. Да не се употребява след изтичане на срока на годност, означен върху опаковката.

Режим на отпускане: “Само по лекарско предписание !”

Дата на последна редакция на листовката :

януари 2001 година

