



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

**HOMEOPLASMINE®
ХОМЕОПЛАЗМИН**

СЪСТАВ

За 100 g

Calendula officinalis tinctura	0,10 g
Phytolacca decandra tinctura	0,30 g
Bryonia dioica tinctura	0,10 g
Benzoe tinctura	0,10 g
Acidum boricum	4,00 g

Помощно вещество: вазелин.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Маз, туба 40 g

ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧЕН КЛАС

Епителотонично и противовъзпалително

ПРИТЕЖАТЕЛ НА

РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:

LABORATOIRES BOIRON

20, rue de la Libération

69110 SAINTE- FOY- LES- LYON

France

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

LABORATOIRES BOIRON

2, avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

France

**В КОИ СЛУЧАИ ДА СЕ УПОТРЕБЯВА
ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ?**

Поддържаща терапия при иритативни дерматити.

(Повърхностни увреждания на кожата:

- повърхностни рани: охлузвания, подсичане, зачервяване, набраздена и напукана кожа, рагади...
- леки изгаряния)

ВНИМАНИЕ!

- В кои случаи не трябва да се използва този лекарствен продукт

ХОМЕОПЛАЗМИН не трябва да се прилага:

- при малки деца под 30 месечна възраст



- при данни за свръхчувствителност към някоя от съставките (или при
групова сенсibiliзация)
- върху свръхинфектирани и секретиращи участъци.

● **Специални предупреждения**

Поради наличието на борна киселина, това лекарствено средство не бива да се използва продължително време и с по-честа повтораемост на апликациите от препоръчаната, върху силно увредена кожа (особено силно изгорена), върху много обширни увреждания, под оклузивна превръзка, особено при малки деца.

Ако след употреба на продукта оплакванията продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.

● **Специални предпазни мерки при употреба**

*При съмнения за правилната употреба, потърсете
мнението на вашия лекар или фармацевт.*

● **Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия**

*За да се избегнат евентуални взаимодействия между много лекарствени
продукти е необходимо системно да информирате вашия лекар или
фармацевт за всякакво лечение, което провеждате в момента.*

● **Бременност и кърмене**

Да не се нанася върху гърдите по време на кърмене.

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

● **Дозировка**

При различни видове повърхностни кожни увреждания (от студ или топлина, прегряване, контактни увреждания, зачервяване на кожата от различен произход) :

- повърхностни рани (охлузвания, подсичане, набраздена и напукана кожа, рагади...): почистете грижливо кожата, след което нанесете внимателно тънък слой от мазта от 1 до 3 пъти дневно.
- леки изгаряния : при възможност изгореният участък веднага да се охлади под течаща студена вода в продължение на няколко минути. След почистване, нанесете внимателно тънък слой от мазта от 1 до 3 пъти дневно, като се обхваща и малка част около изгорената повърхност.

● **Начин на употреба**

Локално – върху кожата

● **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Както всяко активно действащо лекарство, този лекарствен продукт може да доведе до нежелани лекарствени реакции при някои хора.

- Опасност от нежелани реакции (виж: „В кои случаи не трябва да се използва този лекарствен продукт” и “Специални предупреждения”)



- При кърмачета и деца под 30 месечна възраст, борната киселина е била причина за изразена интоксикация. Появата на кожни симптоми (силно изявена и дифузна еритродермия, последвана от десквамация с инициален еритем, появяващ се често в областта на седалището или устата) е сигнал за увреждане.

Не се колебайте да потърсите мнението на вашия лекар или фармацевт и да ги информирате за всяка нежелана лекарствена реакция, която не е упомената в тази листовка.

• ПРЕДОЗИРАНЕ

Свързано с наличието на борна киселина.

Проявите на остро отравяне при случаен прием през устата включват: повръщане и диария, коремни болки, еритематозен обрив върху кожа и лигавици, последван от десквамация, стимулиране или потискане на централната нервна система, гърчове и хипертермия. По-рядко могат да се наблюдават бъбречни и чернодробни увреждания.

Бавната екскреция на борната киселина може да доведе до кумулация при продължителна употреба и до поява на хронично отравяне, при което може да се наблюдава анорексия, стомашно-чревни увреждания, дерматит, анемия, алоpecia, конвулсии и други. Виж: „В кои случаи не трябва да се използва този лекарствен продукт” и “Специални предупреждения”

• СЪХРАНЕНИЕ

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, означен върху външната опаковка.

Да се съхранява при температура до 25°C

Последна редакция на листовката :

Май 2006 г.

Рег. № 20000629

