

**ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
БРОНХОЦИН ДИЕТИЧЕН СИРОП**

**ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
БРОНХОЦИН ДИЕТИЧЕН СИРОП**

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активни вещества в една дозировъчна лъжичка (5.5 мл сироп):

Глауцин хидробромид 5.75 мг

Ефедрин хидрохлорид 4.6 мг

Босилково масло 5.75 мг

Помощни вещества: лимонена киселина, метил парабензоат, пропил парабензоат, захарин натрий, малтодекстрин, аспартам, сорбитол, полисорбат 80, пречистена вода.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Сироп 125g в тъмна стъклена бутилка

Сироп 125g в бутилка от полиетилен терефталат

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

“Балканфарма Троян “АД

5600 Троян, България, PO BOX 82;

тел. (0670) 22 607;

телекс 37 513, 37531, HFZ BG;

факс (0670) 24 139, 22 610

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Бронхоцен диетичен сироп е комбиниран препарат, който потиска кашлицата, разширява бронхите и втечнява секрецията в дихателните пътища. Има и слабо противовъзпалително действие.

ПОКАЗАНИЯ

Прилага се за потискане на кашлицата и втечняване на секрецията при остръ трахеит; остръ катарален бронхит; обострен хроничен бронхит; хронична обструктивна белодробна болест – бронхитна форма; остра бронхопневмония; остра бронхопневмония със спазим на бронхите; разширения на бронхите (брониектазии). Препарата може да се прилага при болни от диабет!

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не се прилага при пациенти, свръхчувствителни към някоя от съставките на препарата, както и при болни с коронарна склероза, ангина пекторис, хиперфункция на щитовидната жлеза, артериална хипертония.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Препаратът се прилага с повишено внимание при неспокойни и превъзбудени пациенти; лица с високо кръвно налягане, при пациенти с глаукома и увеличение на простатата.

При оплаквания от безсъние се препоръчва последният прием на препарата да бъде няколко часа преди сън.

При необходимост от хирургични и стоматологични манипулации пациентите трябва да съобщят за приеманите от тях лекарства, съдържащи ефедрин.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Бронхозин диетичен сироп може да се прилага едновременно с антибиотици и други противовъзпалителни средства; с лекарства, понижаващи температурата и с витамини.

При едновременната му употреба с гванетидин се потиска действието на гванетидина.

Комбинирането на препарата с лекарства против депресия; стимуланти на нервната система; средства за потискане на апетита; лекарства, усиливащи сърдечната дейност; хормони на щитовидната жлеза и общи упойващи средства може да повиши риска от проява на нежелани лекарствени реакции.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ

Да се избягва употреба през първите три месеца на бременността. Ефедринът преминава в кърмата и може да доведе до нежелани реакции у кърмачето. Затова не се препоръчва прилагането му в периода на кърмене.

Децата и пациентите в напреднала възраст са по-чувствителни към ефектите на ефедрина.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Тъй като е възможно да настъпи лека възбуда или унесеност и сънливост, е необходима предпазливост при изпълнение на дейности като шофиране или управление на машини.

ДАННИ ЗА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Бронхочин диетичен сироп съдържа т. нар. парабени като помощни вещества, които в някои случаи могат да станат причина за алергични реакции, а понякога и за свиване на бронхите и задух.

Лекарствената форма съдържа аспартам, който е източник на фенилаланин и не се прилага при фенилкетонурия (наследствено заболяване, което се открива още при раждането).

Този лекарствен продукт съдържа сорбитол. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя 368 mg сорбитол. Неподходящ е при вродена непоносимост към фруктозата. Може да причини стомашно дразнене и диарии.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА

ДОЗИРОВКА

Препаратът се прилага перорално. Без лекарско предписание!

При възрастни се прилагат по 2 дозировъчни лъжички 3-4 пъти дневно.

При деца от 3 до 10 години се прилага по 1 дозировъчна лъжичка 3 пъти дневно.

При деца над 10 години се прилага по 2 дозировъчни лъжички 3 пъти дневно.

Една дозировъчна лъжичка съдържа 5,5 ml сироп.

Препаратът може да се прилага и при диабетици.

ЧЕСТОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилага се 3-4 пъти дневно.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Продължителността на лечението е не повече от 7 дни.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ

Погълдането на голямо количество от препарата може да предизвика нервно напрежение, възбуда, безсъние, треперене на крайниците, усилено потоотделяне, гадене, в някои случаи унесеност и сънливост.

Лечението се състои в стомашна промивка и прилагане на симптоматични средства.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Ако при употреба на Бронхоцин диетичен сироп сте почувствали нежелани лекарствени реакции или други смущения, своевременно уведомете Вашия лекуващ лекар.

Поради съдържанието на ефедрин могат да се наблюдават гадене, повръщане, алергични обриви, сърбеж, отоци по лицето и устните, задух, главоболие, повишаване на кръвното налягане, възбуда, напрегнатост, нарушено зрение, затруднено или болезнено уриниране, слабост и сънливост, бледа и студена кожа.

Препарата може да предизвика успокояващ и отпускащ ефект поради съдържанието на глауцин. Повишена възбудимост може да се наблюдава по-често при деца. В редки случаи може да предизвика запек.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

След първото отваряне опаковката да се съхранява при същите условия 15 дни.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

Две години.

Да не се употребява след изтичане на посочения срок на годност !

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

Февруари, 2001