



Прочетете внимателно листовката преди да започнете да използвате този лекарствен продукт.

Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви въпроси, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Flosteron® suspension for injection
Флостерон инжекционна суспенсия
Betamethasone
Бетаметазон

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 20.06.06

Активно вещество: Betamethasone.

Помощни вещества: натриев хидроген фосфат дихидрат, натриев хлорид, натриев едемат, полисорбат 80e,ベンзилов алкохол, метил паракидроксибензоат, пропил паракидроксибензоат, натриева карбоксиметилцелулоза, макрогол, концентрирана солна киселина, вода за инжекции.

Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

1. КАКВО Е FLOSTERON И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Състав

1 ml от инжекционната суспенсия (1 ампула) съдържа 2 mg betamethasone като disodium phosphate и 5 mg betamethasone като dipropionate.

Опаковка

Кутия с 5 ампули от 1 ml инжекционна суспенсия.

Какво е Flosteron?

Flosteron съдържа активното вещество betamethasone, което е синтетичен кортикоステроид. Той притежава противовъзпалително и имуносупресивно действие и предотвратява реакции на свръхчувствителност. Betamethasone disodium phosphate е лесно разтворимо съединение, бързо се абсорбира в тъканите и притежава бърз ефект. Betamethasone dipropionate има продължително действие, поради по-бавната абсорбция. Комбинацията от двете съединения позволява осъществяване на бърз и продължителен ефект. В зависимост от начина на приложение (вътреставно, околоствино, интравезично, интрадермално, по изключение мускулно), се получават локални или системни терапевтични ефекти.

За какво се използва Flosteron?

Flosteron инжекционна суспенсия (инжекция) се предписва на пациенти, при които е показана преди всичко локална и само по изключение, системна терапия с кортикостероиди.

Локална терапия

Flosteron се предписва вътреставно и околоствино при възпалителни ревматични, заболявания, вътреставно - при дегенеративни ревматични заболявания, особено при наличие на възпаление на синовиалната обвивка (той не се предписва при артрити).





тазобедрена става), извънставен ревматизъм, някои кожни заболявания в случай, че друго проведено лечение няма ефект по отношение на изменениета

Системното лечение

Системното действие на Flosteron се използва при някои тежки алергични заболявания (сезонни или хронични възпаления на лигавицата на носа, реакции на свръхчувствителност).

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ FLOSTERON

Информирайте Вашия лекар, ако имате каквото и да било хронично заболяване, метаболитно заболяване, ако сте свръхчувствителни (алергични) или ако приемате други лекарствени продукти.

Кой не трябва да приема Flosteron?

Вие не трябва да приемате този лекарствен продукт, ако сте свръхчувствителни към betamethasone или някои от помощните му вещества.

Изключвайки специалните случаи, лекарственият продукт не трябва да се използва:

- Ако се лекувате или сте се лекували за туберкулоза,
- Ако се лекувате или сте се лекували за психично заболяване (психози),
- Ако се лекувате за пептична язва на stomахa и дванадесетопърстника,
- Ако сте претърпели чревна операция или имате възпаление на червата (дивертикулит),
- Ако сте претърпели наскоро операция или тежко нараняване,
- Ако се лекувате за глаукома,
- Ако се лекувате за диабет,
- Ако се лекувате за тромбофлебит (тромбоемболизъм),
- Ако имате бактериална или системна гъбична инфекция и не сте получавали адекватно лечение,
- Ако имате бъбречна недостатъчност,
- Ако имате симтоим, причинени от прекомерна употреба на кортикоиди (Cushing's синдром).

Необходимо е да уведомите своя лекар, че се лекувате с betamethasone преди да се ваксинирате с жива ваксина (поне 8 седмици трябва да има интервал между последната доза Flosteron и датата на ваксиниране) или ако сте прекратили лечението си с betamethasone преди по-малко от 14 дни преди ваксинирането.

Специални мерки и предупреждения

Flosteron не трябва да се назначава за венозно приложение или във възпалени или нестабилни стави.

Flosteron не трябва да се прилага в областта на ахилесовото сухожилие, поради опасност от разкъсване на сухожилието.

Преди да започнете лечение с Flosteron, информирайте Вашия лекар:

- Ако се лекувате за остеопороза,
- Ако се лекувате за високо кръвно налягане
- Ако се лекувате за мускулна слабост (myasthenia gravis),
- Ако се лекувате за сърдечна недостатъчност,
- Ако се лекувате за епилепсия,
- Ако имате понижена тиреоидна активност (хипотиреоидизъм),
- Ако имате тежко чернодробно увреждане.

По време на лечението с Flosteron, трябва да избягвате контактите с пациенти, болни от варицела или херпес. В случай на инцидентен контакт, трябва да се консултира с Вашия лекар колкото е възможно по-скоро.





По време на лечението с Flosteron, съществува повишена риска от понижаване на нивото на калий в кръвта, затова, лекарят ще трябва по-често да контролира нивото на калий при продължително лечение.

Лечението ще трябва да се прекратява постепенно след продължително приложение на големи дози.

Преди провеждане на кожни пробы за алергия, уведомете Вашия лекар, че се лекувате с Flosteron.

Вие винаги трябва да имате основна информация за Вашето лечение.

Бременност

Консултирайте се в Вашия лекар или фармацевт преди да приемете каквато и да било лекарствен продукт.

Кортикоидите, при използването им по време на бременност може да имат увреждащ ефект по отношение на плода. Бременните жени трябва да приемат този лекарствен продукт само, ако потенциалната полза за майката, превишава риска за плода.

Кърмене

Консултирайте се в Вашия лекар или фармацевт преди да приемете каквато и да било лекарствен продукт.

По време на лечение трябва да се преустанови кърменето.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни betamethasone да оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Кои други лекарствени продукти взаимодействват с Flosteron?

Каквото и да било лекарствени продукти, дори и такива без рецепт, може да взаимодействат с Flosteron.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате:

- Лекарствени продукти за лечение на високо кръвно налягане,
- Лекарствени продукти увеличаващи отделянето на урината (диуретици),
- Лекарствени продукти за лечение на диабет,
- Лекарствени продукти предотвратяващи коагулирането на кръвта,
- Лекарствени продукти за лечение на безсъние (барбитурати),
- Лекарствени продукти за лечение на епилепсия (carbamazepine, phenytoin, phenobarbitone, primidone),
- Лекарствени продукти за лечение на туберкулоза (rifampicin),
- Лекарствени продукти за отпушване на носа (ephedrine),
- Лекарствени продукти, които облекчават болката или понижават температурата (също така и aspirin),
- Лекарствени продукти за лечение на сърдечна недостатъчност (дигиталисови гликозиди).

Специални предупреждения за помощните вещества

Benzyl alcohol не трябва да се назначава при деца под 3 годишна възраст.

Парахидроксибензоатите причиняват уртикария. Обикновено те предизвиква реакция от забавен тип, такива като контактен дерматит и рядко бърза реакция като уртикария и бронхоспазъм.

3. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА FLOSTERON





Дозировка и начин на приложение

Дозата трябва да се определя индивидуално, в зависимост от състоянието на пациента и тежестта на заболяването.

Локално приложение:

Прилага се доза от 0.25 ml до 2 ml с интервал между апликациите най-малко 4 седмици.

1 до 2 ml се предписват за приложение в много големи стави (тазобедрена) вътреставно или околоставно, 1 ml в големи стави (коленни, раменни или глезнени), 0.5 ml до 1 ml в средноголеми стави (лакетни, гривнени) и 0.25 ml до 0.5 ml в малки стави.

Единичните дози не трябва да превишават 0.2 ml/cm² когато са предписани за приложени в кожните лезии / (в кожа, не подкожно); общата седмична доза за цялата засегната повърхност не трябва да превишава 1 ml.

0.25 ml до 1 ml (до 2 ml в оствър стадий) се предписва при бурсит, 0.5 ml при тендосиновит и тендинит и 0.5 ml до 1 ml при фиброзит.

При нужда Flosteron може да се смеси с локален анестетик с една и съща спринцовка.

Системно приложение при алергични заболявания:

Може да се използва само еднократна доза от 1 до 2 ml (трябва да се приложи мускулно, никога венозно!).

Медикаментът се прилага посредством дълбока мускулна инжекция в глuteалната област.

Ако имате впечатление, че ефекта на лекарствения продукт е твърде силен или твърде слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте получили повече Flosteron отколкото би трябало

Предозиране може да се получи обикновено след няколкоседмично приложение като повечето от нежеланите реакции са посочени в листовката (виж Възможни нежелани реакции), по-специално Cushing's синдром. Лечението при предозиране е симптоматично. Ефектите могат да продължат няколко седмици.

Ако се пропусне доза Flosteron

Лекарят ще определи честотата на приложение. Ако по някаква причина не получите определената по схема инжекция, информирайте Вашия лекар възможно по-бързо.

Ефект от спиране на лечението с Flosteron

Прекратяване на лечението по ваша преценка може да бъде опасно. Ако прекратите лечението предварително, заболяването може да се възстанови.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти, Flosteron също може да има нежелани реакции.

При продължителна употреба на Flosteron, може да се очаква поява на следните нежелани реакции: повишено предразположение към инфекции, развитие на латентни инфекции (туберкулоза), Cushing синдром (лунообразно лице и затъняване на гърба "биволска гърбица"), еднострранна болка в тазобедрената става (проявяваща се с аваскуларна некроза на кости), повишен рисък от пептична язва, повишена съсираваемост на кръвта, лошо застъпване на рани.

В литературата могат да се открият и следните нежелани реакции (наблюдавани при системно приложение, много рядко при локална апликация): загуба на костна маса (остеопороза), фрактури на гръбнака или тазобедрени фрактури, психози, депресии, тромби в кръвоносните съдове (флеботромбоза), потискане на растежа при деца, нарушения в менструалния цикъл, окосмяване, повишение на телесното тегло, бледина, на захарния диабет, руптура на сухожилия, мускулна слабост, отоци, хипокалиемия.





главоболие, катаракта, глаукома, изтъняване и загуба на еластичността на кожата, стрии, повищено вътречно налягане, катаракта, атрофия на кожата, телеангиектазии, стрии, появява на малки кръвоносни съдове по кожната повърхност, акне, повишаване броя на левкоцитите (левкоцитоза).

Ако забележите проявата на каквото и да било нежелани реакции от лекарствения продукт, незабавно информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА FLOSTERON

Срок на годност

Да не се използва след срока на годност, посочен на опаковката.

Условия за съхранение

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Информация за предписване

Само по лекарско предписание

Може да се използва само в здравно заведение от правоспособен персонал.

6. ИНСТРУКЦИИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ

Несъвместимости

Flosteron инжекционна суспензия може да се смесва с локални анестетици в една и съща спринцовка, но съвместимостта трябва винаги да се проверява.

Дата на последна корекция

3 октомври 2003

