

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 08.11.05г.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ACCUZIDE®

АККУЗИД®

(Quinapril/Hydrochlorothiazide)

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете употребата на това лекарство.

Тази листовка ще Ви даде полезна информация за АККУЗИД. Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт. Запазете тази листовка, защото може да пожелаете да я прочетете отново.

Името на това лекарство е АККУЗИД.

Таблетките АККУЗИД съдържат фиксирана комбинация от две лекарствени вещества - quinapril (квинаприл) и hydrochlorothiazide (хидрохлоротиазид). Таблетките съдържат също помощните вещества кросповидон, лактоза, магнезиев карбонат, магнезиев стеарат, повидон, оцветител Е172 и Е171 и воськ от канделелия.

АККУЗИД се предлага в няколко различни дозировки.

АККУЗИД 10/12.5 са розови, елипсовидни филмирани таблетки. Всяка таблетка АККУЗИД 10/12.5 съдържа 10 mg quinapril и 12.5 mg hydrochlorothiazide.

АККУЗИД 20/25 са розови, кръгли филмирани таблетки. Всяка таблетка АККУЗИД 20/25 съдържа 20 mg quinapril и 25 mg hydrochlorothiazide.

АККУЗИД 20/12.5 са розови, триъгълни филмирани таблетки. Всяка таблетка АККУЗИД 20/12.5 съдържа 20 mg quinapril и 12.5 mg hydrochlorothiazide.

АККУЗИД можете да намерите в опаковка по 30, 50 или 100 таблетки.

Кой произвежда Вашето лекарство

Притежател на разрешението за употреба: PFIZER EUROPE MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ

Производител: Gödecke GmbH, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germany

КАКЪВ ВИД ЛЕКАРСТВО Е АККУЗИД?

АККУЗИД съдържа две различни лекарствени вещества - quinapril и hydrochlorothiazide. Quinapril се отнася към група лекарства, наречени инхибитори на аngiotензин конвертирация ензим (ACE инхибитори). ACE инхибиторите най-общо действат като разширяват кръвоносните съдове и по този начин намаляват кръвното налягане. Hydrochlorothiazide се отнася към група лекарства, наречени диуретици. Диуретиците най-общо помагат на тялото да се освободи от излишната телесна течност и се използват и при пациенти с високо кръвно налягане.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО



АККУЗИД е предназначен за лечение на хипертония.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Ако отговорите с “ДА” на някой от следващите въпроси консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете лечението с АККУЗИД, тъй като АККУЗИД може да не подходящ за Вас.

- Алергични ли сте към АККУЗИД или някоя от неговите съставки, описани по-горе?
- Алергични ли сте към други лекарства, подобни на АККУЗИД?
- Алергични ли сте към група антибиотици, наречени сульфонамиди?
- Бременна ли сте? Опитвате ли се да забременеете? Кажете на Вашия лекар веднага щом разберете, че сте бременна.
- Кърмите ли?
- Имате ли проблеми с уринирането?
- Имате ли бъбречно, бъбречно-съдово или чернодробно увреждане?
- Страдате ли от системен лупус еритематозус (заболяване, засягащо съединителната тъкан в различни части на тялото, предимно кожата, ставите, бъбреците и серозните мембрани)?
- Вземате ли други лекарства като например tetracycline (вид антибиотик), литий (антидепресант), други лекарства за намаляване на кръвното налягане (включително калий-съхраняващи диуретици), кортикоステроиди (лекарства, които обикновено се използват за намаляване на възпалението или за потискане на имунитета), адренокортикотропен хормон, нестероидни противовъзпалителни лекарства (като например аспирин, ибупрофен) или миорелаксанти (лекарства за отпускане на мускулатурата)?
- Вземате ли антидиабетни лекарства? Може да е необходима корекция на дозата на антидиабетното лекарство.
- Приемате ли калий-съдържащи добавки (например заместители на готварската сол)?
- Предстои ли Ви десинсибилизиращо лечение към отрова от ципокрили? Това е лечение, при което се цели намаляване на алергичната реакция при ужилване от пчела или оса.
- Предстои ли Ви афереза на липопротеините с ниска плътност (това е отстраняване на холестерола от кръвта с помощта на машина)? Провеждате ли друго лечение за намаляване на холестерола, например с cholestyramine или colestipol?
- Провеждате ли хемодиализа?
- Предстои ли Ви операция или анестезия (обезболяване)?

Съобщете незабавно на Вашия лекар ако по време на лечение с АККУЗИД се появи подуване на лицето, крайниците, очите, устните, езика, затруднения в гълтането или дишането. При наличие на такива оплаквания спрете лечението с АККУЗИД, докато не се консултирате с Вашия лекар.

При поява на виене на свят, особено през първите няколко дни от началото на лечението с АККУЗИД информирайте незабавно Вашия лекар.

Кажете на Вашия лекар, ако по време на лечението с АККУЗИД се появят белези за инфекция като например болки в гърлото или втискане.

Недостатъчният прием на течности, прекаленото потене или обезводняването могат да доведат до прекомерно спадане на кръвното налягане поради намаляване на обема на течности в организма. Повръщането или диарията могат също да доведат до спадане на кръвното налягане. Консултирайте се с Вашия лекар, ако Вашият случай е такъв.

МОЖЕ ЛИ ДА ШОФИРАТЕ, ДОКАТО ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО

Способността за участие в дейности като работа с машини или шофиране може да бъде нарушена, особено в началото на лечението с АККУЗИД.



КАК ДА ПРИЕМАТЕ АККУЗИД

Вашият лекар ще прецени каква дозировка да използвате и ще Ви даде указания как да вземате таблетките АККУЗИД. Ако нещо не Ви е ясно или имате допълнителни въпроси не се колебайте да се консултирате с Вашия лекар.

При пациенти, които в момента не получават диуретик, независимо от това дали изобщо е провеждано самостоятелно лечение с quinapril, препоръчителната начална доза е една таблетка АККУЗИД 10/12.5 (дозата quinapril/ hydrochlorothiazide е съответно 10/12.5 mg). След началния период на лечение дозата може да бъде увеличена в зависимост от показанията.

Различните концентрации, в които се предлага този комбиниран лекарствен продукт - (quinapril/hydrochlorothiazide), позволяват гъвкавост при дозирането на отделните съставки според клиничните показания.

При пациенти, които в момента получават диуретик, препоръчителната начална доза quinapril е 5 mg, за да се намали до минимум възможността от прекалено голямо понижение на кръвното налягане. Дозировката трябва да бъде увеличавана постепенно до постигане на желаното понижение на кръвното налягане. Ако повишението на дозите доведе до дозировки, сходни с тези в комбинирания лекарствен продукт АККУЗИД (quinapril/hydrochlorothiazide), може да се премине към лечение с него.

Вземайте таблетките АККУЗИД точно според указанията на Вашия лекар. Ако не сте сигурни как да приемате АККУЗИД попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Най-добре е да приемате Вашето лекарство по едно и също време всеки ден.

Употреба при деца: АККУЗИД на се препоръчва при деца.

Какво да правите, ако приемете твърде много таблетки

Ако поемете твърде много таблетки, незабавно се консултирайте с Вашия лекар или спешното отделение на най-близката болница.

Какво да правите, ако пропуснете доза

Ако пропуснете доза, вземете я възможно най-скоро, но не и ако е дошло време за следващата доза. Не вземайте двойна доза. Вземете следващата доза в обичайния час.

ПРИЧИНЯВА ЛИ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, така и АККУЗИД освен че помага при вашето заболяване, понякога може да причини и нежелани реакции.

Най-честите нежелани лекарствени реакции са:

- Главоболие, виене на свят, уморяемост;
- Вирусна инфекция;
- Гадене и/или повръщане, болки в корема;
- Миалгия (болка в мускулите), болки в гърба;
- Кащлица;

По-рядко срещани нежелани лекарствени реакции са:

- Някои нарушения в кръвните клетки (хемолитична анемия, тромбоцитопения);
- Алергична реакция;



- Палпитации (сърцебиене), ускорен пулс;
- Хипотония (понижено кръвно налягане), постурална хипотония (понижаване на кръвното налягане при изправяне), припадък;
- Сухота в устата или гърлото;
- Хепатит;
- Загуба на коса, сърбеж, обрив, повишена чувствителност към слънчева светлина и някои други кожни нарушения;

Могат да настъпят някои промени в лабораторните показатели (серумни електролити, креатинин, ureя, пикочна киселина в серума, глюкоза, магнезий, холестерол, триглицериди, протеин-свързан йод, паратиреоидни функционални тестове, калций, хематологични).

Ако получите някоя от тези нежелани лекарствени реакции или забележите някоя друга, консултирайте се с Вашия лекар.

Важно е да информирате Вашия лекар или фармацевт, ако получите някаква нежелана реакция.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Съхранявайте всички лекарства на място, недостъпно за деца!

Съхранявайте Вашето лекарство при стайна температура (под 25°C).

Това лекарство е предписано за Вас. Не го давайте на други хора дори да имат оплаквания подобни на Вашите, тъй като това лекарство може да се окаже неподходящо за тях.

Не използвайте това лекарство след изтичане на срока на годност, означен на опаковката.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашият лекар вероятно ще Ви даде допълнителна информация за Вашето заболяване и неговото лечение.

Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство.

Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Информацията от тази листовка се отнася само за АККУЗИД таблетки.

Дата на последна редакция на листовката:

