

ИАЛ
ОДОБРЕН ОТ
ДАТА 10.02.04г.

**Информация за поциента за
Betahistine MERCK**

**Съхранявайте този лекарствен продукт на място, недостъпно за деца.
Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да вземете този
лекарствен продукт. Тази листовка съдържа резюме на информацията за
Вашия лекарствен продукт Betahistine MERCK.**

ВАШИЯТ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Вашият лекарствен продукт е под формата на таблетка. Таблетките съдържат две различни количества на лекарственото вещество. Всяка от тях съдържа съответно 8 mg от лекарственото вещество Betahistine Dihydrochloride (отпечатано BN 8) и 16 mg от лекарственото вещество Betahistine Dihydrochloride (отпечатано BN 16). Всяка таблетка съдържа също така помощни вещества микрокристална целулоза, манитол, лимонена киселина, силициев диоксид и талк. Betahistine MERCK се продава в опаковки по 30 и по 100 бр. Вашият фармацевт ще Ви отпусне броя таблетки, предписан от Вашия лекар.

Притежател на резрешението за употреба: Generics (UK) Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL
Производители: McDermott laboratories Ltd T/A Gerard Laboratories, 35-36 Baldoyle Industrial Estate, Grande Road, Dublin 13, Eire.
MERCK PHARMA Y QUIMICA, S.A., Ctra. N-152.Km.19.08100-Mollet del Vallés (Barcelona), Spain

ЗАЩО ИМАТЕ НУЖДА ДА ВЗЕМЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ?

Вашият лекар ще Ви предпише Betahistine MERCK, за да Ви помогне да се лекуват симптомите на Мениеров синдром като гадене, световъртеж (замайване), звън или шум в ушите и загуба на слуха. Точният начин, по който Betahistine MERCK действа, не е ясен, но се счита, че подобрява кръвотока и намалява налягането в средното ухо, като така намалява симптомите на Мениеровия синдром.

**КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ ВАШИЯ
ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ?**

Вие трябва да кажете на Вашия лекар преди да вземете този лекарствен продукт, ако:

- сте бременна
- кърмите
- сте приемали Betahistine Dihydrochloride преди и сте развили необичайна или алергична реакция към него
- имате тумор на надбъбречната жлеза, наречен феохромоцитом



- страдате от бронхиална астма, особено ако се лекувате със салбутамол
- имате пептична язва или сте имали пептична язва в миналото
- понякога имате алергични реакции като кожни обриви, сърбеж или ринит
- се лекувате от малария или приемате профилактични средства против малария, особено ако приемате пираметамин или дапсон
- приемате антихистаминови лекарствени продукти
- приемате всякакви други лекарствени продукти

НЕ ПРИЕМАЙТЕ Betahistine MERCK, ако мислите, че сте алергични към него или към някое от помощните вещества, особено микрокристална целулоза.

ДОКАТО ПРИЕМАТЕ ВЕТАHISTINE MERCK

НЕ СПИРАЙТЕ приема на Вашите таблетки, без да се консултирате с Вашия лекар, дори ако мислите, че се чувствате по-добре или ако Ви се струва, че минава доста време, без да се почувствате добре.

ТРЯБВА ДА СТЕ ОСВЕДОМЕНИ, че Betahistine MERCK не трябва да причинява сънливост, но може да има редки изключения. Препоръчва се, ако се почувствате сънливи, да избегвате задачи, изискващи концентрация, като шофиране и/или работа с машини.

ВЗЕМАЙТЕ РЕДОВНО Вашия лекарствен продукт и се опитвайте да не пропускате прием (това е особено важно, когато приемате само една доза дневно)

КАК ТРЯБВА ДА ПРИЕМАТЕ ВАШИТЕ ТАБЛЕТКИ?

Betahistine MERCK таблетки трябва да се приемат с храна.

Възрастни над 18 години (включително и пациенти в напреднала възраст):

Обичайната начална доза е 8 или 16 mg Betahistine dihydrochloride (като една таблетка от 16 mg или две таблетки от 8 mg) три пъти дневно. Вашият лекар ще определи подходящата доза за Вас. Обичайната дневна доза е между 24 mg и 48 mg Betahistine dihydrochloride.

Деца:

Betahistine dihydrochloride не трябва да се приема от деца и юноши под 18 годишна възраст.

Ако сте забравили да приемете една доза от този лекарствен продукт, вземете я колкото е възможно по-скоро. Обаче, ако Вашата следваща доза



е в рамките на 8 часа, не вземайте таблетки сега, изчакайте до следващата доза и продължете да приемате Вашите таблетки както преди.

**АКО СТЕ ПРИЕЛИ ТВЪРДЕ МНОГО ОТ ВАШИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ,
СВЪРЖЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛЕКАР.**

**МОЖЕ ЛИ ВАШИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ДА ИМА НЯКАКВИ
НЕЖЕЛANI ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ?**

Лекарствените продукти имат някои нежелани лекарствени реакции, които варират при различните пациенти. Най-честите за Betahistine са: стомашни неразположения, разстройство или гадене, главоболие, кожни обриви или сърбеж, и понякога сънливост.

**Ако страдате от някоя от тези нежелани лекарствени реакции или
някакъв друг нежелан ефект, моля, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.**

**НЕ ПРИЕМАЙТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА
НА ГОДНОСТ, ПОКАЗАН НА ОПАКОВКАТА.**

ЗАПОМНЕТЕ, че този лекарствен продукт е предписан на Вас от Вашия лекар. **НЕ ГО ДАВАЙТЕ** на други. Може да им навредите. Съхранявайте на сухо място при температура до 25 °C.

Дата на последна редакция на текста:
Нояември 2000 г.

